

* Des urgences psychiatriques *

Les plus grandes urgences psychiatriques :
- Les états d'agitation
- Tentatives de suicides

① États d'agitation

def : Expression motrice d'une excitation psychique qlq part.

* Toute état d'agitation + signes confusionnel → Cause organiq

Onirisme
Hallucinations visuelles
Terrifiantes

desorientation
Temporo-spatiale
délire onirique
(onirisme)

→ Psychoses aiguës

La bouffée Délirante aiguë :

- coup de tonnerre dans un ciel serein

- selon le DSM IV elle est divisée en :

① Troubles psychotiques bref (au moins 1 jrs / < 1 mois)

② " schizophréniforme (1 - 6 mois)

- classiquement < 6 mois

- le risque majeur est l'évolution vers la schizophrénie.

± une participation thymique (l'absence de cette participation est un signe de mauvais pronostic)

+ Examen somatique complet

→ ya des formes sans csqe sans lendemain y guérison complet sous traiteme

Pronostic

bon

- debut brutal
- participation thymique
- l'existence d'un fact. déclenchant

delire riche (plusieurs thèmes)

mauvais

- S^d d'influence
- debut insidieux
- absence de participation thymique
- ATCD
- P. schizoïde.
- P. schizotypique.
- 1 seul thème

→ y a des formes récidivantes

→ évolution

- récedive
- guérison
- schizophrénie.

→ hospitalisation

Chimiothérapie

→ voie injectable.

→ antipsychotiques (1-2 jrs)

inactif
Contre delire

HALoperidol - labial

Chlorpromazine - long actif

sedatif
Contre l'agitation

→ si agitation importante → volium en IV

→ surveillance, puis voie orale.

psychothérapie

- psychothérapie d'entretien
- TCC
- ergothérapie

* P. schizoïde
isolé
peu d'amis
peu évoluer vers
la schizophrénie

schizotypique
pensée magique
bizarre

↳ la psychothérapie : en cas de contre-indication à la chimiothérapie

- ++ grossesse

- résistance au Trt

↳ la durée du Trt → 6 mois

↳ après une rechute → 1 ans

↳ 2^{ème} → 2 ans

↳ 3^{ème} → 5 ans - et s'il rechute encore → à vie

② Confusion mentale

③ Accès maniaque

④ Accès mélancolique.

