

4

# La vie sexuelle et ses perturbations

PPcm

I) Générativité

II) Des dysfonctionnements sexuels

A) chez ♂

B) chez ♀

III) Les paraphilies

IV) Prise en charge

La phase de résolution peut ne pas exister chez ♀

Toute fuite veineuse  
↓  
défaut d'érection  
↳ impuissance

un surdosage en androgène n'a aucun effet sur le désir

## I Générativité

- c'est un acte de vie affirmé par la nature et confirmé par tous les religions
- son déroulement dépend des contraintes biologiques incontournables qui sont : **des androgènes** → le désir, **facteurs psychologiques**
- sa compréhension et la prise en charge d'éventuelles perturbations nécessite l'étude des **facteurs psychologiques** des partenaires
- ainsi que l'étude de leurs **relations entre eux** et avec l'**environnement socio-culturel**.
- Mr Master et Johnson 1938 ont décidé de décrire la réponse sexuelle en 4 phases :
  - excitation
  - plateau
  - orgasmique
  - résolution
- cette séparation a permis une meilleure approche clinique diagnostique et thérapeutique, et complétée par l'étude du désir



## → II Les dysfonctions sexuelles

- Elles sont définies comme une ↓ ou absence d'une partie ou la totalité de la réponse sexuelle en présence de stimulations appropriées

Elles doivent être répétitives pour être considérées comme path.

### A) Chez l'homme.

on a longtemps utilisé le terme impuissance toute impossibilité totale ou partielle à accomplir l'acte sexuel. qui peut être primaire ou IIaire, temporaire ou organisée, liée à la partenaire ou indifférente de celle-ci.

#### → Causes médicamenteuse

- neuroleptique (+++ NAP)

- des anti-hypertenseurs (+++ IEC, anticalcaïques)

#### → alcoolisme et Toxicomanie

- soit par toxicité neurologique

- ou par désinvestissement de tous les sources de plaisir au profit de la recherche de la substance toxique

#### → Les maladies métaboliques et endocriniennes

diabète, dysthyroïdie, cushing, Basalw  
admission

#### → Traitement œstrogénique

#### → Toute intervention sur la vessie et la prostate

- focaliser l'angoisse sur la sphère génitale → peur de la sexualité

#### → maladies neurologiques : SEP, épilepsie, myopathie

#### +++ → psychologiques

plus frq

- la dépression, Troubles obsessionnel
- éducation rigide
- surveillance de la partenaire
- l'absence de motivation (parotisation de la vie conjugales)

## B) Chez la femme

### 1. le vaginisme :

- des contractions involontaires des muscles périméaux et pérvaginaux qui → occlusion de l'orifice vaginal
- impossibilité de pénétration.

- causés par :
- éducation rigide
  - méconnaissance de l'anat de ♂
  - personnalité phobique, hystérique
  - surveillance du partenaire.

### 2. Dyspareunie :

- douleur à la pénétration qui n'est pas en rapport avec un vaginisme ou une sécheresse vaginale
- il faut éliminer un blm organique :
  - vaginite
  - Salpingite
  - rétroflexion de l'utérus
  - mastectomie
- facteurs psychologiques.

## III Les Paraphilies (déviances sexuelles)

- des conduites en rupture avec les pratiques sexuelles culturellement admises, répétitive vécus sans culpabilité
- une véritable impuissance à éprouver de l'orgasme sans la présence d'un environnement, comportement particulier ou d'un objet nécessaire à l'excitation sexuelle
- + frq chez ♂ que ♀

- **fétichisme** : Trouble concernant ♂ nécessite la présence d'un objet prolongeant le corps de la femme (ss vêtements ...) pour obtenir une satisfaction sexuelle
- **de Sadisme** : il a besoin de provoquer une douleur ou une humiliation à fin d'éprouver une satisfaction
- **masochisme** : il a besoin de subir une douleur ou une humiliation à fin d'éprouver une satisfaction
- **Transvestisme** : il a besoin de porter les vêtements du sexe opposé à fin d'éprouver sa satisfaction
- **homosexualité** : attirance vers le m sexe
- **fratrilisme** : sujet
- **microphlie** : attirance vers les cadavre
- **zoophilie** : attirance vers les animaux (démences schizo-phréniques déficitaire, débilite profonde)
- **Urogeunisme** : observer en leur insus un couple qui se deshabile, activité intime à fin d'éprouver une satisfaction

## → IV. Prise en charge

### ① Tnt non spécifiques

- permettre la verbalisation du trouble, sa compréhension, sa dédramatisation → peuvent suffire à lever l'inhibition

- Thérapie du groupe (un excellent soutien, formatif et informatif, améliore l'estime de soi. ↑ renforcement narcissique)
- des massages réciproques qui peuvent redonner au corps une sensibilité perdue et relance la communication dans le couple
- des exercices physiques réguliers → reprise de la tonicité des muscles péniens
- des cures de relaxation → contrôler l'anxiété
- la rééducation psycho-motrice et sensorielle → 3 étapes :
  - interdiction de tous contacts
  - autorisation des contacts verbaux et massages
  - " " " non verbaux

## ② Trt spécifique

- c'est un Trt étiologique s. MDM → changer le molécule
  - Toxicomane → prise en charge contre l'addiction
  - Trouble d'érection → papaverine.
  - le miel, amphétamines -- fruits --- amandes ---
- pour améliorer l'excitation
- des stimulants de la libido, androgène en cas de sous-dosage  
la prostoglandine E en intracaverneuses

*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*