QCM CORRIGES PARTIE CLINIQUE

Quelle est la donnée hémodynamique qui permet d'apprécier l'importance d'une
insuffisance aortique ?

A - Elévation de la pression auriculaire droite
B - Abaissement de la pression diastolique aortique
C - Abaissement de la pression systolique de l'artère pulmonaire
D - Egalisation des pressions systoliques gauches et droites
E - Inégalité des pressions systoliques entre membres inférieurs et membres supérieurs

Bonne(s) réponse(s) : B

Parmi les viscères suivants, quel est celui dont l'atteinte n'implique pas le classement de la maladie de Hodgkin dans le stade IV ?

A - Le foie
B - Le parenchyme pulmonaire
C - Le cerveau
D - La rate
E - La peau

Bonne(s) réponse(s) : D

Concernant la fièvre typhoïde, une ou plusieurs de ces affirmations sont vraies.
La ou lesquelles ?

A - La diarrhée est régulièrement présente au deuxième septénaire
B - Une hyperleucocytose avec polynucléose neutrophile doit faire rechercher une perforation digestive
C - Les anticorps anti O peuvent ne pas apparaître si le malade est traité
D - Au premier septénaire, le diagnostic peur être affirmé sur l'existence d'anticorps anti-H
E - L'amoxicilline seule, per os, constitue un traitement correct de la fièvre
typhoïde

Bonne(s) réponse(s) : B C E

Parmi les cinq formules de liquide céphalorachidien suivantes. Quelle est la plus évocatrice d'une compression médullaire ?

A - Protéines 0,309/l cytologie : nulle
B - Protéines 0,309/l cytologie : 400 Iymphocytes/mm3
C - Protéines 0,409/l cytologie : 22 Iymphocytes/mm3
D - Protéines 1,809/l cytologie : nulle
E - Protéines 0,300/l cytologie : 100 polynucléaires/mm3

Bonne(s) réponse(s) : D

L'ictère néonatal par incompatibilité Rhésus foeto-maternelle anti-D :

A - Survient si la mère est rhésus positif et l'enfant rhésus négatif
B - Est un ictère présent dès la naissance
C - Est un ictère insensible à la photothérapie
D - Peut être associé à une anémie, qui fait la gravité du pronostic immédiat
E - Est un ictère à bilirubine libre

Bonne(s) réponse(s) : B D E

L'infarctus sous-endocardique est caractérisé à la phase aiguë par tous les éléments suivants, sauf un. Lequel ?
énoncé

A - Atteinte ventriculaire gauche non transmurale
B - Elévation enzymatique constante
C - Apparition constante d'onde Q, significatives sur I'ECG
D - Lésion sous-endocardique isolée sur l'ECG
E - Douleur constrictive médio-thoracique prolongée

Bonne(s) réponse(s) : C

L'exploration d'une immunoglobuline monoclonale IgG Kappa à 40 g/l nécessite

A - Des radiographies de squelette
B - Un myélogramme
C - Une urographie intra-veineuse
D - Une lymphographie
E - Un dosage de la calcémie

Bonne(s) réponse(s) : A B E

Un traitement efficace des fièvres typhoïdes peut être réalisé par :

A - Pénicilline G
B - Ampicilline
C - Chloramphénicol
D - Sulfaméthoxazole-Triméthoprime
E - Gentamicine

Bonne(s) réponse(s) : B C D

Parmi les médicaments ci-après, lequel n'est pas un inhibiteur spécifique de
l'entrée du calcium dans la cellule cardiaque ?

A - La nifédipine (Adalate®)
B - Le vérapamil (Isoptine®)
C - Le diltiazem (Tildiem®)
D - Le diazoxide (Hyperstat®)
E - Le bépridil (Cordium®)

Bonne(s) réponse(s) : D

Parmi les symptômes suivants, quels sont les trois qui par leur fréquence, ont
une valeur pour le diagnostic de sclérose en plaques ?

A - Paraparésie asymétrique
B - Hypoacousie unilatérale
C - Hypertonie extra-pyramidale
D - Névrite optique rétro-bulbaire
E - Ophtalmoplégie internucléaire

Bonne(s) réponse(s) : A D E

Un ictère est apparu avant la 12ème heure de vie chez un nouveau-né. La ou
les cause(s) susceptible(s) d'expliquer cet ictère sont la ou les suivantes :

A - Infection bactérienne septicémique
B - Hémolyse par incompatibilité foeto-maternelle
C - Obstruction des voies biliaires
D - Hépatite virale
E - Cholémie familiale

Bonne(s) réponse(s) : A B

On reconnait comme cause(s) d'aplasie médullaire ?

A - Traitement par le Chloramphénicol
B - Exposition professionnelle au risque benzénique
C - Insuffisance rénale chronique
D - Cancer métastatique de la moelle
E - Hépatite virale

Bonne(s) réponse(s) : A B E

Parmi les signes suivants, un seul fait partie du tableau classique de l'ictère
simple du nouveau-né à terme. Lequel ?

A - Début clinique le second jour de vie
B - Splénomégalie
C - Pigmenturie
D - Décoloration des selles
E - Hépatomégalie

Bonne(s) réponse(s) : A

Quel est le signe clinique déterminant pour suspecter le diagnostic de coarctation de l'aorte ?

A - Pouls fémoraux mal perçus

B - Essoufflement à l'effort
C - Hypertension artérielle aux membres supérieurs
D - Différence de pulsabilité artérielle entre artère radiale et artère fémorale
E - Cyanose des extrémités

Bonne(s) réponse(s) : A

Une encéphalopathie hyperbilirubinémique (ictère nucléaire) peut compliquer
l'évolution de :

A - L'incompatibilité foeto-maternelle rhésus
B - L'ictère du prématuré
C - L'ictère au lait de femme
D - L'ictère par déficit en G 6 P D
E - L'ictère de la maladie de Crigler-Najjar

Bonne(s) réponse(s) : A B D

L'observation de cellules de Sternberg est indispensable au diagnostic de :

A - La maladie de Kahler
B - La maladie de Hodgkin
C - Le Iymphome de Burkitt
D - La leucémie à tricholeucocytes
E - La leucémie myéloblastique

Bonne(s) réponse(s) : B

Parmi les propositions suivantes concernant la digoxine, désignez la réponse
fausse :

A - La digoxine augmente le tonus vagal au niveau du coeur
B - Favorise l'accumulation intracellulaire du potassium
C - Favorise l'accumulation intracellulaire du sodium
D - Favorise l'accumulation intracellulaire du calcium ionisé
E - Inhibe l'ATP ase NK+, K+ dépendante

Bonne(s) réponse(s) : B

La ou les maladie(s) suivante(s) est(sont) la cause de fièvre avec leucopénie :

A - Fièvre typhoïde
B - Hépatite virale
C - Leishmaniose viscérale
D - Brucellose aiguë
E - Erysipèle

Bonne(s) réponse(s) : A B D

Parmi les signes biologiques suivants quels sont ceux qui sont présents au cours d'une crise de rhumatisme articulaire aigu ?

A - Accélération de la VS au-dessus de 50 mm à la première heure
B - Augmentation du taux de la fibrinémie
C - Hémoculture positive au streptocoque du groupe A
D - Augmentation du taux des ASLO au-dessus de 600 U/ml
E - Augmentation du taux des antistreptodornases

Bonne(s) réponse(s) : A B D E

Une femme de 28 ans présente une fièvre intermittente réalisant des clochers
fébriles à 39°5 entre lesquels la température est normale. Ce type de courbe
thermique peut s'observer au cours des affections suivantes, sauf une. Laquelle?

A - Accès palustre
B - Septicémie à germes anaérobies
C - Fièvre typhoïde non compliquée
D - Septicémie à staphylocoques dorés
E - Septicémie à colibacilles

Bonne(s) réponse(s) : C

Parmi les propositions ci-dessous laquelle caractérise la mortinatalité ?

A - C'est le nombre de mort-nés à partir de la 28ème semaine de gestation
B - C'est le nombre de décès de la 28ème semaine de gestation au 7ème

jour après la naissance
C - C'est le nombre de décès de 0 à 6 jours
D - C'est un indicateur sensible aux actions de lutte contre les maladies infectieuses

Bonne(s) réponse(s):A

Quelles sont les complications de la diverticulose colique ?

A - le cancer colique
B - la maladie de Crohn
C - la fistule sigmoïdo-vésicale
D - l'abcès péri-colique
E - la colite ischémique

Bonne(s) réponse(s) :CD

Quel est parmi les éléments suivants, celui qui est corrélé au risque de transformation d'un polype adénomateux en cancer colique ?

A - la topographie des adénomes
B - le caractère pédiculé de l'adénome
C - l'âge des malades
D - la richesse de l'adénome en composante villeuse
E - l'hypervascularisation de l'adénome

Bonne(s) réponse(s) :D

L'hépatomégalie de l'insuffisance cardiaque droite est :

A - Dure avec surface irrégulière
B - Lisse et douloureuse à la palpation
C - Totalement indolore à la palpation
D - Généralement associée à une vésicule palpable
E - Parfois expansive à la systole

Bonne(s) réponse(s) : B E

L'hépatite virale B (indiquez la proposition inexacte)

A - sur 100 000 sujets ayant une infection aiguë au virus B 90 000 ont fait une hépatite symptomatique ictérique
B - la réplication complète du virus B est prouvée par la présence d'une activité DNA polymérase positive avec antigène HBs positif, antigène Hbe positif et DNA viral dans le sang circulant
C - la positivité de l'anticorps HBc a deux significations : exposition ancienne s'il s'agit d'IgG, infection récente s'il s'agit d'IgM
D - la persistance d'antigène Hbe au delà de six mois implique un risque de chroncité
E - il existe une relation entre le portage du virus B et l'apparition d'un cancer primitif du foie

Bonne(s) réponse(s) :A

A l'autopsie d'un sujet découvert mort sur le dos, dans son véhicule, on fait les constatations suivantes : absence de lésion traumatique, lividités cadavériques rosées à la face et cyanose unguéale, sans de couleur rouge vermillon. Quel diagnostic de cause de mort évoquez-vous ?

A - infarctus du myocarde
B - intoxication éthylique aiguë
C - intoxication à l'oxyde de carbone
D - intoxication aux organo-phosphorés
E - intoxication au cyanure

Bonne(s) réponse(s) :C

Dans les hépatites B, parmi les traitements suivants, quel est celui qui est contre indiqué car il peut favoriser la réplication virale ?

A - la vitamine B 12
B - le sérum glucosé isotonique
C - les corticoïdes
D - la vidarabine
E - l'interféron

Bonne(s) réponse(s) : C

Quel est approximativement le taux de mortalité infantile actuellement en Algérie ?

A - Dix pour mille
B - Vingt pour mille
C - Quarante pour mille
D - Soixante pour mille
E - Cent pour mille

Bonne(s) réponse(s):C

Au cours du rétrécissement mitral pur, la saillie et l'allongement de l'arc moyen
gauche à la radio sont dues à :

A - La dilatation du tronc de l'artère pulmonaire
B - La dilatation de la crosse de l'aorte
C - La réduction du volume ventriculaire gauche avec abaissement consécutif du point
D - La stase veineuse dans le hile gauche
E - La dilatation de l'auricule gauche

Bonne(s) réponse(s) : A E

22-L'esperance de vie des algériens de sexe masculin à la naissance est estimée à

A - 50 ans
B - 60 ans
C - 65 ans
D - 75 ans
E - 80 ans

Bonne(s) réponse(s):D
La complication la plus fréquente du traitement des hyperthyroïdies par l'I 131®
est :

A - La survenue d'un cancer thyroïdien ultérieur
B - La crise aiguë thyréotoxique
C - Le choc à l'iode
D - L'hypothyroïdie secondaire
E - L'hypoparathyroïdie

Bonne(s) réponse(s) : D

Au cours des troubles fonctionnels intestinaux les signes suivants évoquent le diagnostic sauf un, lequel ?

A - alternance diarrhée-constipation
B - rectorragie
C - ballonnement post-prandial
D - douleurs abdominales soulagées par l'émission des selles
E - présence de glaires associées aux selles

Bonne(s) réponse(s) :B

L'examen médical d'embauche pour un trvailleur qui va être exposé au mercure a pour but(s) :

A - De rechercher si le sujet n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour
les autres travailleurs
B - D'éviter l'embauche de personnes handicapées
C - De s'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail
auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter
D - D'éviter l'embauche d'une femme en début de grossesse
E - De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à
d'autres postes

Bonne(s) réponse(s) : A C D E

Dans les formes cliniques de la Maladie de Basedow il est possible (en dehors
de toute prise médicamenteuse) d'observer :

A - Une thyrotoxicose sans goître
B - Un goître sans thyrotoxicose
C - Une exophtalmie sans thyrotoxicose
D - Une thyrotoxicose sans autonomie thyroïdienne, ni exophtalmie
E - Les 4 éventualités suscitées

Bonne(s) réponse(s) : A B C

Une femme âgée de 40 ans est veuve depuis 6 mois. Elle désire se remarier. Quel délai légal doit-elle encore attendre avant de pouvoir contracter un nouveau mariage ?

A - 30 jours
B - 60 jours
C - 120 jours
D - 300 jours
E - 365 jours

Bonne(s) réponse(s) :C

Le COCAETHYLENE est un puissant dérivé de la cocaïne formé en présence de

A - héroïne
B - cannabis
C - ecstasy.
D - alcool.
E - L.S.D.

Bonne(s) réponse(s) :D

La gale humaine chez l'adulte est caractérisée par :

A - Des lésions interdigitales
B - L'absence de prurit
C - La contagiosité importante
D - L'atteinte du visage
E - Le respect des organes génitaux externes

Bonne(s) réponse(s) : A C

Parmi les propositions suivantes concernant les attributions du Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins, laquelle ou lesquelles est(sont) vraie(s) ?

A - vérifie les conditions d'exercice
B - vérifie les qualifications et compétences
C - vérifie les conditions d'installation
D - transmet les plaintes des particuliers au Conseil Régional
E - correspond à la juridiction disciplinaire de 1ère Instance

Bonne(s) réponse(s) :ABCD

Quelles sont parmi les causes de constipation acquise suivantes celles qui sont vraies ?

A - hypothyroïdie
B - cancer du colon
C - maladie de Hirschprung
D - Spina Bifida
E - tumeur de la queue de cheval

Bonne(s) réponse(s) :ABE

Les pneumoconioses indemnisables sont dues aux poussières de :

A - Silice
B - Béryllium
C - Amiante
D - Chrome
E - Fer

Bonne(s) réponse(s) : A B C E

Parmi les propositions suivantes concernant la maladie de Crohn, quelles sont celles qui son vraies ?

A - elle peut atteindre le rectum
B - l'atteinte digestive peut s'associer à des manifestations extra-digestives cutanées, articulaires et oculaires
C - elle est guérie par la résection chirurgicale des zones malades
D - elle peut entraîner des fistules et abcès de l'anus
E - elle est peu sensible au traitement corticoïdes

Bonne(s) réponse(s) :ABD

Parmi ces manifestations, une hypoglycémie est évoquée devant :

A - Pâleur
B - Convulsions
C - Sueurs
D - Soif
E - Diplopie

Bonne(s) réponse(s) : A B C D E

Parmi les propositions suivantes concernant la rectocolite hémorragiques, quelles sont celles qui sont vraies ?

A - elle atteint souvent le colon, le rectum et l'intestin grêle
B - la lésion histologique caractéristique de la maladie est le granulome tuberculoïde intra-muqueux
C - elle peut entraîner des fistules et abcès de l'anus
D - elle est guérie par le colo-proctectomie totale
E - elle se caractérise par des lésions endoscopiques diffuses sans intervalle de muqueuse saine

Bonne(s) réponse(s) : DE

L'eczéma se caractérise par :

A - Le polymorphisme clinique des lésions
B - Le prurit
C - Une spongiose épidermique à l'histologie
D - La sensibilité aux corticoïdes locaux
E - La guérison avec cicatrice

Bonne(s) réponse(s) : A B C D

L'usage de la corticothérapie locale est contre-indiqué dans :

A - Le zona
B - L'acné rosacée
C - L'eczéma allergique
D - L'herpès
E - Le psoriasis du cuir chevelu

Bonne(s) réponse(s) : A B D

L'association d'une scintigraphie thyroïdienne blanche et d'une hormonémie
thyroïdienne élevée peut s'observer :

1 - Dans une thyroïdite subaiguë
2 - Dans une hyperthyroïdie par saturation iodée
3 - Dans une thyrotoxicose factice
4 - Dans un goître par trouble de l'hormonosynthèse

Compléments corrects : 1,2,3=A 1,3=B 2,4=C 4=D 1,2,3,4=E

Bonne(s) réponse(s) : A

parmi les séquelles possibles au décours d'une intoxication à l'oxyde de carbone on peut rencontrer :

1 - Des manifestations psychiatriques
2 - Des troubles moteurs
3 - Un syndrome de Parkinson
4 - Une insuffisance respiratoire chronique

Compléments corrects: 1,2,3=A 1,3=B 2,4=C 4=D 1,2,3,4=E

Bonne(s) réponse(s) : A

Le psoriasis du cuir chevelu a toutes les caractéristiques suivantes, sauf une.
Laquelle ?

A - Il est parfois isolé
B - Il est érythémato-squameux
C - Il est source d'alopécie
D - Il peut siéger à n'importe quel endroit du cuir chevelu
E - Il est parfois prurigineux

Bonne(s) réponse(s) : C

Un psoriasis peut se compliquer de :

A - Une érythrodermie,
B - Survenue de pustules amicrobiennes
C - Une atteinte rénale
D - Un rhumatisme
E - Une transformation néoplasique

Bonne(s) réponse(s) : A B D

Laquelle ou lesquelles des propositions suivantes correspond(ent) à des manifestations physiques du syndrome de sevrage en opiacés

A - douleur
B - mydriase
C - constipation
D - rhinorrhée
E - hypothermie

Bonne(s) réponse(s) :ABD

Parmi les signes fonctionnels suivants de reflux gastro-oesophagien l'un est faux, lequel ?

A - dysphagie paradoxale aux liquides
B - pyrosis
C - régurgitations

D - syndrome postural
E - otalgie bilatérale

Bonne(s) réponse(s) :A

La déclaration de saturnisme , (affection figurant au tableau des maladies professionnelles indemnisables)
doit être effectuée obligatoirement :

A - Par le médecin traitant
B - Par le médecin du travail
C - Par le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie
D - Par l'employeur avec diagnostic posé par le médecin du travail
E - Aucune de ces propositions n'est exacte

Bonne(s) réponse(s) : E

La période d'incapacité totale de travail au sens pénal du terme correspond à l'une des périodes suivantes, laquelle ?

A - période d'arrêt de travail
B - période pendant laquelle le sujet a perdu son autonomie fonctionnelle
C - période s'étendant de l'accident à la date de consolidation
D - période s'étendant de l'accident à la date de guérison
E - période s'étendant de l'accident à la date d'expertise

Bonne(s) réponse(s) :B

Devant un volumineux goître sans signes cliniques de compression, euthyroïdien, refoulant la trachée radiologiquement, hétérogène en scintigraphie, quels sont les deux risques évolutifs qui incitent à une exérèse
chirurgicale ?

A - Troubles compressifs par goitre bénin
B - nécrose
C - Dégénérescence maligne
D - Basedowification
E - Hémorragie intra-glandulaire

Bonne(s) réponse(s) : A C

Devant un tableau d'insuffisance ventriculaire droite, sans étiologie évidente, on
retient en faveur d'une insuffisance respiratoire chronique :

1 - Souffle systolique d'insuffisance tricuspidienne
2 - Gros foie douloureux
3 - Sur l'ECG, onde T négative en V1, V2, V3
4 - PCO2 du sang artériel à 48 mmHg (6,4 Kpa)

Compléments corrects : 1,2,3=A 1,3=B 2,4=C 4=D 1,2,3,4=E

Bonne(s) réponse(s) : D

Parmi les propositions suivantes, indiquez celle qui caractérise la schizophrénie:

A - Des conduites agressives antisociales et la dangerosité
B - Le syndrome dissociatif
C - L'angoisse de castration
D - L'existence d'une phobie spécifique
E - Une névrose bénigne

Bonne(s) réponse(s) : B

Chez un adolescent présentant un syndrome néphrotique pur mais corticorésistant, la lésion histologique rénale la plus vraisemblable est :

A - Glomérulonéprhite proliférative extra-capillaire
B - Glomérulonéprhite à dépôts mésangiaux d'IgA
C - Hyalinose segmentaire et focale des glomérules
D - Glomérulonéphrite proliférative endocapillaire
E - Glomérulonéphrite membrano-proliférative

Bonne(s) réponse(s) : C

Parmi les affections suivantes, laquelle n'est pas susceptible de dégénérer en
épithélioma spino-cellulaire ?

A - Bowen
B - Kératose arsenicale
C - Kératose solaire
D - Radiodermite
E - Verrue séborrhéique

Bonne(s) réponse(s) : E

Une femme de 35 ans est atteinte d'un rétrécissement mitral en arythmie complète par fibrillation auriculaire. Elle ressent brutalement une douleur vive
du mollet qui s'accompagne bientôt d'un engourdissement puis d'une impotence complète. A l'examen, la jambe et le pied sont froids. Quel est votre
diagnostic ?

A - Thrombose artérielle
B - Phlébite
C - Embolie artérielle
D - Accès de goutte
E - Arthrite rhumatismale

Bonne(s) réponse(s) : C

L'épithélioma basocellulaire :

1 - Donne habituellement des métastases
2 - S'accompagne d'adénopathies
3 - Peut atteindre les muqueuses
4 - Peut récidiver après traitement

Compléments corrects : 1,2,3=A 1,3=B 2,4=C 4=D 1,2,3,4=E

Bonne(s) réponse(s) : D

Parmi les médicaments suivants, quels sont les trois qui contiennent de la triiodothyronine (T3) ?

A - Extraits thyroïdiens totaux ou thyroïdine
B - Cynomel®
C - Euthyral®
D - Thyroxine gouttes
E - Lévothyrox®

Bonne(s) réponse(s) : A B C

Devant un tableau confirmé d'ischémie aiguë d'un membre inférieur, on retient
en faveur d'une étiologie athéromateuse :

A - Absence de pouls distaux à l'autre membre
B - Douleur brutale du mollet
C - Troubles neurologiques
D - Antécédents de claudication intermittente du membre atteint
E - Infarctus du myocarde

Bonne(s) réponse(s) : A D

Quelle(s) manifestation(s) peut(vent) être observées au cours d'un phéochromocytome ?

A - Une courbe d'HGPO plate
B - Une hypotension orthostatique
C - Une mort subite par collapsus cardiovasculaire
D - Une baisse de la tension artérielle après administration de sulpiride (Dogmatil®)
E - L'association à une neurofibromatose de Recklinghausen

Bonne(s) réponse(s) : B C

Au cours de l'eczéma on peut observer :

A - Un suintement
B - Une desquamation
C - Un oedème
D - Une érythrodermie
E - Un prurit
Bonne(s) réponse(s) : A B C D E

Parmi ces propositions concernant la schizophrénie. indiquez laquelle ou lesquelles sont exactes :

A - La modification de la personnalité est toujours brutale
B - Toutes les dimensions de la personnalité sont atteintes
C - Le sentiment de l'unité interne de la personnalité à disparu
D - Les capacités d'adaptation sont souvent altérées

E - Le délire et la discordance sont exclusifs l'un de l'autre

Bonne(s) réponse(s) : B C D

La forme histologique la plus fréquente du cancer thyroïdien chez l'enfant est le
cancer :

A - Vésiculaire
B - Papillaire
C - Médullaire
D - Spino-cellulaire
E - Indifférencié

Bonne(s) réponse(s) : B

La structure histologique de l'eczéma se définit essentiellement par :

A - L'oedème papillaire
B - L'infiltrat péri-vasculaire
C - La spongiose épidermique
D - La vacuolisation des cellules épithéliales
E - Aucun de ces signes

Bonne(s) réponse(s) : C

La symptomatologie de la schizophrénie comporte :

A - autisme
B - pensée logique
C - pensée hermétique
D - ambivalence
E - psycho-rigidité

Bonne(s) réponse(s) : A C D

Après une lobectomie pour nodule froid isolé, quelles sont les deux complications les plus à craindre ?

A - Paralysie récurrentielle
B - Hypoparathyroïdie
C - Hypothyroïdie
D - Trachéomalacie
E - Hémorragie

Bonne(s) réponse(s) : A E

La conduite thérapeutique courante dans le syndrome néphrotique pur comporte :

A - La prednisone à 2 mg/kg/jour
B - L'aspirine à 100 mg/kg/jour
C - La vitamine A
D - Un régime limité en Na, en eau mais riche en calories
E - Des suppléments de vitamine D

Bonne(s) réponse(s) : A D E

Parmi les affections suivantes, quelle est la seule indication de la corticothérapie locale ?

A - Candidose inguinale
B - Impétigo
C - Ulcère de jambe atone
D - Zona
E - Psoriasis

Bonne(s) réponse(s) : E

Un comportement marqué par le maniérisme et des rires immotivés, vous fait
penser à quelle affection mentale parmi les suivantes :

A - mélancolie
B - névrose obsessionnelle
C - schizophrénie
D - délire paraphrénique
E - délire paranoïaque

Bonne(s) réponse(s) : C

Une oblitération de l'artère poplitée chez un sujet de moins de 40 ans peut être
due à :

A - L'athérome
B - Des anomalies musculo-tendineuses
C - Une arthrite du genou
D - Une phlébite poplitée
E - Un kyste colloïde sous-adventiciel

Bonne(s) réponse(s) : A B E

Dans quel(s) type(s) d'hyperthyroïdie une absence complète de fixation isotopique est observée à la scintigraphie ?

A - Maladie de Basedow
B - Adénome toxique
C - Hyperthyroïdie à l'iode
D - Thyroïdite subaiguë
E - Thyrotoxicose factice

Bonne(s) réponse(s) : C D E

Parmi les éléments biologiques suivants, lequel ou lesquels définissent le syndrome néphrotique :

A - Protéinurie supérieure à 5 cg/kg/j
B - Hématurie supérieure à 20 globules rouges/mm3
C - Protidémie inférieure à 50 g/l
D - Cholestérolémie supérieure à 6 millimoles/l
E - Créatinine sérique supérieure à 100 micromoles

Bonne(s) réponse(s) : A C

Quand un état dépressif est suspecté de représenter le début d'une psychose
schizophrénique, un ou plusieurs des signes suivants fait ou font évoquer la
schizophrénie :

A - L'humeur douloureuse et pénible
B - L'agoraphobie
C - Le détachement affectif
D - L'insomnie d'endormissement
E - La discordance mimique

Bonne(s) réponse(s) : C E

Un sujet de 17 ans présente une protéinurie permanente avec cytologie urinaire
normale. Le dosage pondéral est de 7,3 g/24 heures. Le diagnostic le plus probable est :

A - Syndrome néphrotique
B - Glomérulonéphrite subaiguë
C - Protéinurie de Bence-Jones
D - Protéinurie orthostatique fonctionnelle
E - Tubulopathie congénitale

Bonne(s) réponse(s) : A

Parmi ces 5 bêta-bloquants d'usage courant, une activité sympathomimétrique
intrinsèque marquée est une propriété de :

A - Propranolol (Avlocardyl®)
B - Pindolol (Visken®)
C - Aténolol (Ténormine®)
D - Métoprolol (Séloken® ou Lopressor®)
E - Timolol (Timacor®)

Bonne(s) réponse(s) : B

Dans un syndrome néphrotique il y a toujours :

A - Une hypoalbuminémie inférieure à 30 g/l
B - Une augmentation du cholestérol plasmatique
C - Une augmentation des gammaglobulines sériques
D - Une concentration basse du sodium urinaire
E - Un risque de thrombose des vaisseaux

Bonne(s) réponse(s) : A E

Parmi les signes cliniques suivants, rencontrés chez un sujet porteur d'un cancer bronchique épidermoïde, quel élément a la signification pronostique la
plus sévère ?

A - Hippocratisme digital
B - Toux rebelle

C - Voix bitonale
D - Hémoptysies minimes mais répétées
E - Ils ont tous la même valeur pronostique

Bonne(s) réponse(s) : C

Parmi les stupéfiants suivants, un seul est entièrement synthétique, lequel ?

A - morphine
B - héroïne (diacétylmorphine)
C - cannabis
D - crack
E - ecstasy (amphétamine)

Bonne(s) réponse(s) :E

Quand faut-il effectuer une coloscopie en cas d'antécédent familial de cancer colique ? (une seule réponse juste)

A - immédiatement quelque soit l'âge du sujet
B - à partir de 40-45 ans
C - dès l'âge de 20 ans
D - à 60 ans
E - après recherche de sang dans les selles par test Hemocult(r)

Bonne(s) réponse(s) :B

Chez un insuffisant rénal chronique, on observe fréquemment les troubles suivants sauf un, lequel ?

A - Diminution des réactions immunitaires
B - Ostéodystrophie
C - Hypoparathyroïdie
D - Anémie normochrome
E - Retard de conduction nerveuse

Bonne(s) réponse(s) : C

Au cours d'un cancer bronchique, vous suspectez une métastase cérébrale. L'examen le plus adapté pour affirmer le diagnostic est :

A - Ponction lombaire
B - Fond d'oeil
C - Scanographie
D - Electroencéphalogramme
E - Artériographie cérébrale

Bonne(s) réponse(s) : C

Quelle est la tumeur du foie qui peut être secondaire à la prise d'oestro-progestatifs ?

A - hépatocarcinome
B - tumeur carcinoïde
C - adénome solitaire
D - hémangiome
E - hamartome

Bonne(s) réponse(s) :C

L'anémie de l'insuffisant rénal chronique est habituellement :

1 - Associée à une diminution de la durée de vie des hématies
2 - Hypochrome
3 - Normocytaire
4 - Régénérative

Compléments corrects : 1,2,3=A 1,3=B 2,4=C 4=D 1,2,3,4=E

Bonne(s) réponse(s) : B

L'insuffisance rénale chronique s'accompagne le plus souvent de :

1 - Une anémie normochrome
2 - Une hyperuricémie
3 - Une hypocalcémie
4 - Une alcalose métabolique

Compléments corrects : 1,2,3=A 1,3=B 2,4=C 4=D 1,2,3,4=E

Bonne(s) réponse(s) : A

Dans laquelle des situations ou législations suivantes est-il possible d'obtenir réparation d'une préjudice esthétique ?

A - maladies professionnelles
B - pensions militaires
C - assurance individuelle de personne
D - accident du travail
E - accident de trajet (dans la législation des accidents de travail)

Bonne(s) réponse(s) :E

Parmi les complications de la pancréatite chronique, quelles sont celles qui justifient une sanction chirurgicale ?

A - sténose duodénale
B - syndrome douloureux persistant malgré le sevrage
C - diabète instable
D - pseudo-kyste récidivant après ponction
E - ictère par obstruction

Bonne(s) réponse(s) :ABDE

Au cours de l'insuffisance rénale chronique à un stade avancé, les anomalies
biologiques suivantes sont habituelles à l'exception de l'une d'entre d'elles. Laquelle ?

A - Hémoglobine à 7,8 g/l
B - Bicarbonates plasmatiques à 20 mmol/l (20 mEq/l)
C - Phosphorémie à 0,20 mmol/l (6mg/l)
D - Azotémie à 42 mmol/l (2,46g/l)
E - Uricémie à 550 ?mol/l (92 mg/l)

Bonne(s) réponse(s) : C

La pHmétrie oesophagienne est souhaitable dans les cas suivants : (une seule réponse juste)

A - devant tout pyrosis avec oesophagite ulcérée constatée à l'endoscopie
B - avant tout traitement anti-secrétoire de 4 semaines
C - chez les patients présentant des douleurs rétrosternales avec bilan cardiologique (examen clinique électrocardiogramme, scintigraphie myocardique) normal
D - chez les patients présentant une dysphagie avant tout autre examen
E - en cas d'hématémèse de faible abondance

Bonne(s) réponse(s) :C

Le bilan d'un cancer de l'œsophage doit comporter, entre autres, les examens suivants :

A - laryngoscopie indirecte
B - écho-endoscopie
C - fibroscopie bronchique
D - médiastinoscopie
E - scanner cervico-médiastinal

Bonne(s) réponse(s) :ABCE

Quels sont parmi les germes suivants isolés sur une coproculture ceux qui sont considérés comme forcément pathogènes :

A - E.Coli
B - Salmonela enteritidis
C - Yersinia enterolitica
D - Staphylococcus aureus
E - Candida albicans

Bonne(s) réponse(s) :BC

L'intoxication aiguë à la cocaïne entraîne :

A - une tachycardie
B - une HTA
C - une sudation
D - une sédation
E - des tremblements

Bonne(s) réponse(s) :ABCE

Au cours d'une hépatite aiguë, on doit redouter une forme grave fulminante devant :

A - un temps de Quick (TP) inférieur à 20%
B - des vomissements
C - un ictère intense
D - une détérioration rapide de l'état neurologique
E - un prurit

Bonne(s) réponse(s) :A

Devant une hémoptysie isolée de faible importance un seul des examens suivants doit faire partie du bilan réalisé en première intention. Lequel ?

A - Artériographie bronchique
B - Exploration fonctionnelle respiratoire
C - Fibroscopie bronchique
D - Bronchographie
E - Phlébographie des membres inférieurs

Bonne(s) réponse(s) : C

Parmi ces différents types de responsabilité laquelle ou lesquelles peu(vent) être recherchée(s) devant un tribunal à l'encontre d'un médecin d'exercice exclusivement privé :

A - responsabilité pénale
B - responsabilité disciplinaire
C - responsabilité civile
D - responsabilité administrative
E - responsabilité professionnelle

Bonne(s) réponse(s) :AC

Parmi les définitions suivantes, celle qui correspond à la bronchite chronique
(définitivement admise sur le plan international) est :

A - Toux et expectoration pendant 2 ans au moins
B - Expectoration et toux persistante pendant au moins 2 ans
C - Toux et expectoration pendant au moins 3 mois/an et pendant 2 ans consécutifs
D - Toux et expectoration persistante pendant 1 an
E - Toux persistante pendant 6 mois consécutifs et pendant 3 années consécutives

Bonne(s) réponse(s) : C

Parmi les propositions suivantes concernant la maladie de Crohn, l'une est fausse ?

A - La maladie de Crohn peut atteindre tous les segments du tube digestif
B - Des signes d'inflammation extra-digestive sont fréquemment associés aux signes digestifs au cours de la maladie de Crohn
C - La maladie de Crohn évolue par poussées entrecoupées de période de rémission
D - Dans la maladie de Crohn, les lésions sont continues sans intervalle de muqueuse saine
E - 90% des patients atteints de maladie de Crohn sont opérés au moins un fois dans leur vie

Bonne(s) réponse(s) : D

Une insuffisance rénale aiguë oligo-anurique :

A - Peut s'observer dans une glomérulonéphrite aiguë
B - Peut être consécutive à une transfusion compatible
C - Peut être consécutive à un coma éthylique négligé
D - Peut faire suite à une septicémie à colibacilles
E - Peut compliquer une cholécystographie orale

Bonne(s) réponse(s) : A C D E
Le score de Silverman (ou indice de rétraction) cote de 0 à 2 :

A - Le geignement expiratoire
B - Le battement des ailes du nez
C - Le tirage sus-sternal
D - Le balancement thoraco-abdominal
E - Le creusement xiphoïdien

Bonne(s) réponse(s) : A B D E

Parmi les propositions suivantes concernant les diarrhées chroniques, l'une est fausse :

A - La diarrhée des laxatifs est de loin la plus fréquente des diarrhées iatrogènes
B - Au cours d'une diarrhée motrice, le volume des selles est généralement modéré
C - La diarrhées sécrétoire disparaît lors de l'épreuve du jeun
D - Une tumeur carcinoïde peut être une cause de diarrhée motrice
E - Le diagnostic de maladie coeliaque repose sur la présence d'une atrophie villositaire totale à l'examen histologique de la muqueuse duodénale

Bonne(s) réponse(s) :C

Un médecin peut voir sa responsabilité pénale engagée au cours de son exercice dans la ou les situation(s) suivante(s) :

A - non respect du secret médical en cas de sévices à enfant
B - abstention fautive
C - homicide volontaire
D - prélèvement d'organes hors dispositions légales
E - coups et blessures involontaires entraînant une incapacité totale du travail de 12 jours.

Bonne(s) réponse(s) :BCDE

Chez un tuberculeux traité par une association rifampicine - I.N.H - éthambutol
apparaît un ictère. Il faut :

A - Diminuer les doses d'I.N.H.
B - Diminuer les doses de Rifampicine®
C - Supprimer l'I.N.H.
D - Supprimer la Rifampicine®
E - Supprimer l'éthambutol

Bonne(s) réponse(s) : C

L'ulcère duodénal : parmi les propositions suivantes, laquelle est fausse ?

A - peut dégénérer
B - peut saigner
C - peut se perforer
D - peut sténoser
E - peut se fistuliser

Bonne(s) réponse(s) :A

Indiquez le(s) caractère(s) épidémiologique(s) des hépatites C (donner les propositions justes)

A - dépistage (anticorps anti-HVC) obligatoire en France pour tous les dons de sang
B - passent à l'état chronique dans 60 % des cas.
C - évoluent neuf fois sur dix sous forme asymptomatique
D - transmission par voie sanguine
E - exposent à long terme au risque de cirrhose dans 20 % des cas des formes chroniques

Bonne(s) réponse(s) :ABCDE

Devant une carence en vitamine B 12, indiquer la seule anomalie qui ne soit
jamais en cause :

A - Absence de sécrétion du facteur intrinsèque par gastrite atrophique
B - Infestation par le bothriocéphale
C - Maladie de l'iléon
D - Insuffisance hépatique
E - Gastrectomie totale

Bonne(s) réponse(s) : D

Des adénopathies médiastinales sont souvent observées au cours :

A - D'une maladie de Hodgkin thoracique
B - D'une sarcoïdose
C - D'un poumon de fermier
D - D'une primo-infection tuberculeuse
E - D'un abcès du poumon

Bonne(s) réponse(s) : A B D

Dans une crise d'asthme simple de l'adulte, on observe :

A - Une dyspnée expiratoire
B - Un début habituellement aigu
C - Des râles sibilants
D - Une irrégularité du rythme respiratoire
E - Une fréquence respiratoire inférieure à 8/mn

Bonne(s) réponse(s) : A B C

Devant la survenue pour la première fois, chez un adulte jeune, d'un pneumothorax spontané avec moignon pulmonaire rétracté au médiastin, indiquez la conduite à proposer :

A - Ponction pleurale
B - Drainage pleural
C - Pleuroscopie avec talcage
D - Thoracotomie pour création d'une symphyse pleurale
E - Abstention sous surveillance

Bonne(s) réponse(s) : B

Un homme de 56 ans consulte pour anémie. Les premiers résultats hématologiques sont les suivants :
Hématies : 2 M/mm3
Hématocrites : 24 %
Hémoglobine : 8g/100 ml
Il existe une anémie :

A - Normochrome normocytaire
B - Normochrome microcytaire
C - Hypochrome microcytaire
D - Normochrome macrocytaire
E - Aucune de ces propositions n'est exacte

Bonne(s) réponse(s) : D

Parmi les examens complémentaires suivants lequel permet de porter le diagnostic de reflux gastro-oesophagien ?

A - transit oesophagien
B - manométrie oesophagienne
C - scintigraphie oesophagienne
D - pH métrie de 3h
E - gastroscopie

Bonne(s) réponse(s) :D

Quel est l'élément essentiel du traitement d'une insuffisance respiratoire chronique grave par bronchite chronique ?

A - Bronchodilatateur
B - Kinésithérapie
C - Oxygénothérapie
D - Fluidifiant bronchique
E - Antiobiothérapie

Bonne(s) réponse(s) : C

Dans laquelle(lesquelles) des circonstances suivantes une myélémie peut-elle
se rencontrer ?

A - Leucémie myéloïde chronique
B - Splénomégalie myéloïde
C - Envahissement de la moelle métastatique
D - Maladie de hodgkin stade III A
E - Tabagisme

Bonne(s) réponse(s) : A B C

Un taux très élevé d'acide hyaluronique dans le liquide pleural fait suspecter :

A - Une métastase pleurale d'un épithélioma du sein
B - Une pleurésie asbestosique bénigne
C - Une maladie de Hodgkin
D - Une pleurésie secondaire à une pancréatite aiguë
E - Un mésothéliome pleural malin

Bonne(s) réponse(s) : E

Au cours du diabète non insulino-dépendant traité :

A - L'autosurveillance glycémique est indispensable
B - Le poids est un élément de surveillance capital
C - Les sulfamides hypoglycémiants sont contre-indiqués formellement en cas d'insuffisance respiratoire
D - Les biguanides agissent essentiellement en faisant sécréter de l'insuline
E - Les biguanides sont contre-indiqués en cas d'insuffisance hépatique

Bonne(s) réponse(s) : B E

Quels sont, parmi les éléments énumérés ci-dessous, celui ou ceux qui expliquent la survenue de l'ictère simple chez le nouveau-né prématuré ?

A - Immaturité hépatique
B - Fragilité érythrocytaire
C - Hypoalbuminémie
D - Ralentissement du transit intestinal
E - Retard du démarrage de l'alimentation

Bonne(s) réponse(s) : A B D

9. La leucémie myéloïde chronique classique comporte :

A - La présence d'un chromosome Philadelphie
B - Une splénomégalie
C - Une anisopoïkilocytose importante des hématies
D - Une myélémie
E - Un acide urique souvent élevé

Bonne(s) réponse(s) : A B D E

Tous les caractères suivants sauf un peuvent caractériser une leucémie lymphoïde chronique. Lequel ?

A - Atteinte préférentielle en dessous de l'age de 25 ans
B - Adénopathies superficielles dans de multiples territoires
C - Infiltration lymphocytaire pathologique de la moelle osseuse
D - Fréquence des complications infectieuses
E - Symétrie des adénopathies superficielles

Bonne(s) réponse(s) : A

Au cours de la cirrhose alcoolique du foie quelles sont les réponses justes ?

A - le foie est macroscopiquement macronodulaire
B - il existe des corps de Mallory et une stéatose à grosses gouttelettes à la ponction biopsie hépatique (examen histologique)
C - la fusion des béta et gamma globulines est inconstante
D - le risque de rupture de varices oesophagiennes est plus faible qu'au cours des cirrhoses post-hépatitiques
E - l'indication de greffe hépatique est rare mais possible

Bonne(s) réponse(s) :ABE

Parmi les symptômes suivants, lequel ou lesquels se voie(nt) dans l'hypercortisolisme ?

A - L'hypertrichose
B - Les épisodes psychotiques
C - Les oedèmes malléolaires
D - L'épaississement du derme
E - Les coliques néphrétiques

Bonne(s) réponse(s) : A B C E

Parmi les manifestations suivantes de l'hypertension portale, une est fausse, laquelle ?

A - splénomégalie
B - circulation veineuse collatérale des flancs abdominaus
C - varices cardio-tubérositaires
D - facteur V inférieur à 50%
E - hypersplénisme

Bonne(s) réponse(s) :D

Dans la surveillance du traitement diurétique d'une ascite non associée à des oedèmes des membres inférieurs, tous les événements suivants doivent faire arrêter le traitement sauf un, lequel ?

A - natrémie inférieure à 130 meq/l
B - créatinine sanguine supérieure à 20 mg/l
C - kaliémie inférieure à 3,0 meq/l
D - perte de plus de 5 kilos en 2 semaines
E - poids inchangé au bout de 4 semaines de traitement

Bonne(s) réponse(s) :D

Quelle(s) séquelle(s) neurologique(s) peu(ven)t laisser une hyperbilirubinémie
libre négligée de la période néo-natale :

1 - Hémiplégie
2 - Athétose
3 - Epilepsie
4 - Surdité

Compléments corrects: 1,2,3=A 1,3=B 2,4=C 4=D 1,2,3,4=E

Bonne(s) réponse(s) : C

Pour explorer la fonction du grêle, lesquels parmi les tests suivants sont perturbés en cas de malabsorption par atrophie villositaire totale proximale ?

A - xylosémie à 2h
B - taux de folates sériques
C - taux de vit.B12 sérique
D - taux de sels biliaires circulants
E - clairance de l'alpha-1-antitrypsine

Bonne(s) réponse(s) :AB

La séméiologie du syndrome de Cushing comporte classiquement :

A - Amyotrophie
B - Tachycardie
C - Acné
D - Douleurs osseuses
E - Infiltration cutanéo-muqueuse

Bonne(s) réponse(s) : A C D

Parmi les causes de l'ictère néonatal, laquelle est le plus souvent rencontrée
chez le prématuré ?

A - Incompatibilité rhésus
B - Immaturité hépatique
C - Déficit en G6PD
D - Maladie de Gilbert
E - Atrésie des voies biliaires

Bonne(s) réponse(s) : B

Parmi les 5 propositions suivantes quelle est celle (quelles sont celles) que vous retenez ? L'adénome toxique thyroïdien a pour traitement radical :

A - Exérèse chirurgicale
B - Freination hypophysaire grâce à de la T 3
C - Antithyroïdien de synthèse
D - Irradiation interstitielle (Iode 131)
E - Traitement iodé prolongé

Bonne(s) réponse(s) : A D

Parmi les propositions suivantes, indiquez la ou les propositions correctes :

A - L'ictère physiologique du nouveau-né est un ictère à bilirubine conjuguée
B - L'ictère par incompatibilité foeto-maternelle Rh apparaît après plus de 24
heures de vie
C - La photothérapie par la lumière bleue active les processus enzymatiques
de la glycuro-conjugaison
D - L'administration de gardénal en cas de bilirubine élevée chez le nouveauné
a pour but de protéger d'éventuelles convulsions
E - Aucune des propositions précédentes n'est exacte

Bonne(s) réponse(s) : E

Une cartographie thyroïdienne blanche peut s'observer au cours de :

1 - La thyréotoxicose factice
2 - La thyroïdite subaiguë à sa phase aiguë
3 - L'hyperthyroïdie avec surcharge iodée
4 - La maladie de Basedow traitée par béta bloquants

Compléments corrects : 1,2,3=A 1,3=B 2,4=C 4=D 1,2,3,4=E

Bonne(s) réponse(s) : A
Quel est le mécanisme psychique conscient dominant qui caractérise la formation du délire paranoïaque ?

1 - Imagination
2 - Hallucination
3 - Illusion
4 - Interprétation

Compléments corrects : 1,2,3=A 1,3=B 2,4=C 4=D 1,2,3,4=E

Bonne(s) réponse(s) : D

Un ou plusieurs des éléments proposés sont exacts. Répondre lequel ou lesquels. Le coma acido-cétosique du diabète comporte :

1 - Hypotonie
2 - Respiration de Küssmaul
3 - Une déshydratation
4 - Un signe de Babinski

Compléments corrects : 1,2,3=A 1,3=B 2,4=C 4=D 1,2,3,4=E

Bonne(s) réponse(s) : A

La seroprophylaxie ou immunoprophylaxie confère :

A - Une immunité générale contre la maladie
B - Une protection rapide et longue contre la maladie
C - Une protection immédiate mais temporaire
D - Une immunité active contre la maladie
E - Pas d'immunité du tout

Chez un patient de 30 ans, présentant des accès de migraine commune. à la
fréquence de 2 par semaine en moyenne, et certains suffisamment intenses
pour entraîner un arrêt de travail de 24 heures, lequel de ces éventuels
traitements per os n'est pas adapté pour une prescription au long cours ?

A - Dihydro-ergotamine® 9 mg/j (3 comprimés ou 90 gouttes/j)
B - Tartrate d'Ergotamine 3 mg/j (Gynergène Caféiné® 3 comprimés/j)
C - Amitriptyline 75 mg/j (Laroxyl 25®, 3 comprimés/j)
D - Propranolol 120 mg/j (Avlocardyl® 3 comprimés /j)
E - Pizotifène 150 mg/j (Sanmigran® 3 comprimés/j)

Bonne(s) réponse(s) : B

Parmi ces médications anti-épileptiques. il en est une qui est active uniquement
sur le Petit mal. Indiquez la réponse exacte. :

A - Phénytoïne (Di-Hydan®)
B - Ethosuximide (Zarontin®)
C - Clonazépam (Rivotril®)
D - Phénobarbital (Gardénal®)
E - Carbamazépine (Tégrétol®)

Bonne(s) réponse(s) : B

L'ataxie cérébelleuse est caractérisée par :

A - Un élargissement du polygone de sustentation
B - Un steppage
C - Une danse des jambiers antérieurs
D - Un signe de Romberg
E - Une démarche "talonnante"

Bonne(s) réponse(s) : A C

Dans la première semaine de l'évolution d'une fièvre typhoïde, un des moyens
suivants doit être mis en oeuvre de façon systématique et prioritaire. Lequel ?

A - Coproculture
B - Hémoculture
C - Uroculture
D - Séro diagnostic
E - Aucun des précédents n'est vrai

Bonne(s) réponse(s) : B

L'épilepsie à pointes rolandiques de l'enfant est caractérisée par :

A - La fréquence des états de mal
B - La fréquence des crises oro-faciales
C - Un pronostic favorable
D - Des anomalies spécifiques à la scannographie
E - Sa résistance aux anti-épileptiques

Bonne(s) réponse(s) : B C

L'examen indispensable pour surveiller la bonne tolérance d'un antithyroïdien
de synthèse est :

A - Hémogramme
B - Glycémie
C - Calcémie
D - Uricémie
E - Créatininémie

Bonne(s) réponse(s) : A

Parmi les propositions suivantes, laquelle(lesquelles) caractérise(nt) un délire
paranoïaque passionnel ?

A - L'âge de début à l'adolescence
B - La coexistence de troubles thymiques de type dépressif
C - La cohérence du délire
D - Le mécanisme interprétatif prédominant
E - La bonne réponse aux traitements neuroleptiques

Bonne(s) réponse(s) : C D

La chimioprophylaxie est actuellement recommandée pour la protection contre les maladies suivantes sauf une. Laquelle ?

A - La méningite cérébrospinale
B - Le paludisme
C - La rougeole
D - Les syndromes post-streptococciques
Bonne(s) réponse(s) :B

Si la fièvre typhoïde est une maladie à transmission directe possible, la transmission indirecte est plus fréquente Parmi les modalités suivantes, citer
celle(s) qui peu(ven)t être en cause au cours de cette maladie :

A - Consommation de crudités
B - Contact avec les animaux domestiques (chat,chien)
C - Consommation de coquillages
D - Injections médicamenteuses
E - Eau de boisson

Bonne(s) réponse(s) : A C E

Le liquide céphalorachidien d'un sujet atteint de sclérose en plaques comporte
typiquement :

A - Une hypercytose lymphocytaire discrète
B - Une hyperprotéinorachie supérieure à 19/l
C - Une polynucléose
D - Une distribution oligo-clonale du profil électrophorétique des protéines
E - Une hypoglycorrachie

Bonne(s) réponse(s) : A D

Le diagnostic de thyroïdite d'Hashimoto est compatible avec :

1 - Une hyperthyroïdie avec élévation des anticorps antithyroïdiens
2 - Un nodule isofixant thyroïdien
3 - Une T4 effondrée et une TSH élevée
4 - Un goître soufflant

Compléments corrects : 1,2,3=A 1,3=B 2,4=C 4=D 1,2,3,4=E

Bonne(s) réponse(s) : A

Un traitement efficace des fièvres typhoïdes peut être réalisé par :

A - Ceftriaxone
B - Ampicilline
C - Chloramphénicol
D - Sulfaméthoxazole-triméthoprime
E - Péfloxacine

Bonne(s) réponse(s) : A B C D E

La bromocriptine (Parlodel®) est un médicament :

A - Hypolipidémiant
B - Agoniste dopaminergique
C - Hyperprolactinémiant
D - Antibiotique
E - Antithyroïdien

Bonne(s) réponse(s) : B

La transmission de la fièvre typhoïde peut se faire selon une ou plusieurs des
modalités suivantes :

A - Transmission manuportée
B - Injection parentérale septique
C - Transmission par agents vecteurs inertes

D - Contamination de plaie cutanée
E - Transmission hydrique

Bonne(s) réponse(s) : A C E

Parmi les propositions suivantes, laquelle ou lequelles caractérise(nt) un délire
paranoïde :

A - C'est un délire logique
B - C'est un délire d'indignité
C - Le mécanisme prédominant est interprétatif
D - C'est un délire peu organisé, difficilement compréhensible
E - Le mécanisme prédominant est imaginatif

Bonne(s) réponse(s) : D

Le vaccin anti-rougeoleux est un vaccin :

A - Bactérien vivant
B - Viral atténué
C - Viral inactivé
D - Bacterien inactivé
E - Anatoxine

Après traitement correct d'une fièvre typhoïde, un sujet reste porteur de salmonelles. Que doit-on rechercher ?

A - Un abcès splénique
B - Une lithiase biliaire
C - Un ulcère de l'estomac
D - Un diverticule de Meckel
E - Un abcès appendiculaire

Bonne(s) réponse(s) : B

Dans un syndrome de Cushing on peut observer :

A - Répartition prédominante des graisses à la partie supérieure du corps
B - Peau épaissie
C - Hypertrophie musculaire
D - Hypertension artérielle
E - Aménorrhée

Bonne(s) réponse(s) : A D E

Parmi ces vaccins, lequel n'est pas inclus dans le PEV en Algérie ?

A - Vaccin anti-hépatite B forme pédiatrique
B - Vaccin anti-rougeoleux
C - Vaccin anti-grippal
D - Vaccin anti-tétanique

Bonne(s) réponse(s) :C

Les formes graves et les formes psychotiques de dépression peuvent être très
améliorées par :

A - Les fortes doses d'antidépresseurs tricycliques
B - Les thérapies de déconditionnement
C - Les anxiolytiques type benzodiazépine
D - Les sismothérapies
E - La relaxation

Bonne(s) réponse(s) : A D

Lequel, parmi ces critères d'efficacité d'un vaccin,n'est pas juste ?

A - Il faut respecter les délais de vaccination
B - L'efficacite est en relation avec la souche virale utilisée
C - L'efficacité est indépendante du statut nutritionnel
D - Le mode d'administration du vaccin
E - La présence d'anticorps maternels
Bonne(s) réponse(s) :B

Les délires paranoïaques :

A - Débutent à l'adolescence
B - Ont pour thème caractéristique des idées de culpabilité
C - Sont de mécanisme interprétatif
D - Ont une structure logique et cohérente
E - Evoluent de façon périodique

Bonne(s) réponse(s) : C D

Parmi les propositions suivantes concernant la dissection aortique aiguë, citez
celle(s) qui est (sont) correcte(s) :

1 - Devant un syndrome douloureux thoracique, une insuffisance coronarienne aiguë (électrique et enzymatique) élimine le diagnostic de dissection aortique
2 - La rupture intra-péricardique du néo-canal est la principale cause de décès
3 - L'athérome coronarien favorise les dissections
4 - La dissection aortique aiguë peut être favorisée par une grossesse

Compléments corrects : 1,2,3=A 1,3=B 2,4=C 4=D 1,2,3,4=E

Bonne(s) réponse(s) : C

Quels sont le ou les symptôme(s) qui peut ou peuvent s'observer dans la dépression mélancolique ?

A - Echolalie
B - Aprosexie
C - Catalepsie
D - Amaigrissement
E - Constipation

Bonne(s) réponse(s) : C D E

Chez un épileptique la survenue d'anomalies irritatives sur les traces encéphalographiques peut être favorisée par :

A - L'hyperpnée
B - L'injection intraveineuse d'une benzodiazépine
C - Le sommeil
D - La stimulation lumineuse intermittente
E - L'absorption d'un bêta bloquant une heure avant l'enregistrement

Bonne(s) réponse(s) : A C D

Dans les antécédents de patients souffrant de dépression, on observe couramment :

A - Une agoraphobie
B - Un sevrage alcoolique
C - Un traitement neuroleptique prolongé
D - Des paroxysmes anxieux (attaques de paniques)
E - Un sevrage aux opiacés

Bonne(s) réponse(s) : D

Parmi les causes de diarrhée chronique hormonale suivantes, sur quels éléments évoque-t-on un syndrome carcinoïde ?

A - diarrhée abondante et graisseuse
B - bouffées vasomotrices (flushs)
C - insuffisance tricuspidienne
D - augmentation du taux sérique de thyrocalcitonine
E - temps de transit inférieur à 4 h

Bonne(s) réponse(s) :BC

Parmi les symptômes suivants, quel est celui ou quels sont ceux qui sont des
signes de dépression ?

A - Désorientation temporo-spatiale
B - Ralentissement psychomoteur
C - Perte des intérêts
D - Idées de ruine
E - Besoin de vérifier ce qu'on vient de faire

Bonne(s) réponse(s) : B C D

Le diagnostic positif de leucémie aiguë est basé sur :

A - La lymphographie
B - La scintigraphie médullaire
C - La splénomégalie
D - Le myélogramme
E - L'etude cytogénétique

Bonne(s) réponse(s) : D

Quand un état dépressif est suspecté de représenter le début d'une psychose
schizophrénique, un ou plusieurs des signes suivants fait ou font évoquer la

schizophrénie :

A - L'humeur douloureuse et pénible
B - L'agoraphobie
C - Le détachement affectif
D - L'insomnie d'endormissement
E - La discordance mimique

Bonne(s) réponse(s) : C E

Au cours d'une sigmoïdite diverticulaire, toutes ces complications peuvent survenir sauf une ?
A - La fistule sigmoïdo-vésicale
B - La cancérisation
C - La fistule sigmoïdo-vaginale
D - L'occlusion intestinale
E - La fistule sigmoïdo-iléale

Bonne(s) réponse(s) :B

Chez un enfant présentant un petit mal avec absences typiques, le traitement le
plus logique actuellement en première intention est :

A - Le Gardénal® (phénobarbital)
B - La Dépakine® (valproate de sodium)
C - Le Zarontin® (éthosuximide)
D - Le Valium® (diazépam)
E - Le Tégrétol® (carbamazépine)

Bonne(s) réponse(s) : B

Au cours de la migraine accompagnée :

A - La survenue d'une hémiplégie est fréquente
B - Les phénomènes d'accompagnement durent pendant toute la durée du mal de tête
C - S'il existe des paresthésies, elles prédominent au niveau de la bouche et de la main et sont unilatérales
D - Il peut exister des phénomènes aphasiques temporaires
E - L'EEG en cours de crise peut être perturbé

Bonne(s) réponse(s) : C D E

Parmi les tableaux pathologiques suivants quel est celui dans lequel on ne rencontre jamais de crise d'agitation d'une manière caractéristique ?

A - névrose d'angoisse
B - névrose obsessionnelle
C - névrose hystérique
D - névrose de caractère
E - bouffée délirante

Bonne(s) réponse(s) : B

Le(s) médicament(s) agissant sur le petit mal est(sont) :

A - Les barbituriques
B - La carbamazépine (Tegretol®)
C - La diphénylhydantoïne (Dihydan®)
D - Le valproate de sodium (Depakine®)
E - L'éthosuximide (Zarontin®)

Bonne(s) réponse(s) : D E

Quel est, parmi les examens suivants, le plus fiable pour le diagnostic d'embolie
pulmonaire ?

A - Le dosage de la LDH
B - La mesure des gaz du sang
C - L'électrocardiogramme
D - La scintigraphie pulmonaire
E - L'angiographie pulmonaire

Bonne(s) réponse(s) : E

Les syncopes, favorisées par certains changements de position, s'observent
avec prédilection au cours des circonstances étiologiques suivantes, sauf une,
laquelle ?

A - Au cours du myxome de l'oreillette gauche
B - Au cours de la maladie d'Adams stokes
C - Au cours de l'hypotention artérielle orthostatique
D - Au cours de l'insuffisance vertébro-basilaire
E - Au cours de l'hypersensibilité du sinus carotidien

Bonne(s) réponse(s) : B

Parmi les propositions suivantes, retenez celle(s) qui plaide(nt) en faveur du
diagnostic d'épilepsie généralisée primaire :

A - Les crises sont des absences petit mal
B - Il existe des antécédents de souffrance néo-natale
C - L'électroencéphalogramme objective des anomalies paroxystiques bilatérales synchrones
D - L'examen clinique intercritique est normal
E - Il existe des antécédents familiaux d'épilepsie

Bonne(s) réponse(s) : A C D E

Dans la sclérose en plaques :

A - Une hémianopsie latérale homonyme est souvent constatée
B - L'augmentation des gammaglobulines dans le L.C.R. s'accompagne d'une distribution oligoclonale
C - Il peut exister des troubles sphinctériens
D - Le traitement repose sur les corticoïdes au long cours
E - La vitesse de sédimentation globulaire est habituellement augmentée

Bonne(s) réponse(s) : B C

Quelle est l'affection la plus souvent responsable de rectorragies survenant après les selles et les arrosant ?

A - fistule anale
B - tumeur villeuse rectale non dégénérée
C - ulcération thermométrique
D - recto-colite hémorragique
E - hémorroïdes

Bonne(s) réponse(s) :E

L'épilepsie à paroxysmes rolandiques :

A - Provoque le plus souvent des crises à localisation oro-faciale
B - A une survenue liée au sommeil
C - Touche le nourrisson avant 2 ans
D - Comporte un foyer de pointes lentes rolandiques à l'EEG
E - Evolue souvent vers l'épilepsie généralisée de type grand mal

Bonne(s) réponse(s) : A B D

Pendant une lipothymie, l'enregistrement continu de l'ECG, montre les anomalies suivantes. Toutes peuvent être responsables de la lipothymie, sauf
une, laquelle ?

A - Torsade de pointe
B - Tachycardie ventriculaire
C - Bloc sino-auriculaire
D - Bloc de branche gauche
E - Bloc auriculo-ventriculaire du 2ème degré

Bonne(s) réponse(s) : D

Une femme de 19 ans est agitée. logorrhéique et d'humeur très variable. L'agitation stéréotypée, l'absence d'adéquation permanente entre les idées exprimées et les émotions apparentes ainsi qu'une absence de contact réel avec l'environnement permettent de poser l'un des 5 diagnostics suivants :

A - manie
B - bouffée délirante
C - forme aiguë de début de schizophrénie
D - hystérie
E - mélancolie anxieuse

Bonne(s) réponse(s) : B

Parmi les propositions suivantes. quelle est celle qui correspond au stade III
anatomique de la maladie de Hodgkin ?

A - Atteinte de 2 groupes ganglionnaires contigus d'un même côté du diaphragme
B - Atteinte de la rate et de ganglions sous-diaphragmatiques
C - Atteinte de ganglions sus et sous-diaphragmatiques
D - Atteinte viscérale à distance d'une atteinte ganglionnaire
E - Atteinte viscérale avec signes généraux

Bonne(s) réponse(s) : C

L'ingestion d'un seul des médicaments suivants peut être suivie de selles noires, lequel ?

A - gluconate de fer
B - ampicilline
C - sels d'or
D - acide ursodésoxycholique
E - azathioprine

Bonne(s) réponse(s) :A

Parmi les indications suivantes à une coloscopie quelles sont celles qui sont justes ?

A - diarrhée chronique
B - rectorragies
C - vomissements
D - douleurs abdominales
E - anémie microcytaire

Bonne(s) réponse(s) :ABE

Une pancytopénie peut être due à toutes ces causes, sauf une. Laquelle ?

A - Leucémie aiguë
B - Maladie de Biermer
C - Métastase médullaire de cancer
D - Syndrome myélodysplasique (anémie réfractaire)
E - Maladie de Minkowski Chauffard

Bonne(s) réponse(s) : E
Parmi les éléments suivants, lequel (lesquels) témoigne (ent) d'une carence
martiale ?

A - Une pâleur des téguments
B - Un syndrome hémorragique
C - Un volume globulaire moyen à 90 microns cubes
D - Une sidérémie à 100 microgrammes/100 ml
E - Une saturation de la sidérophyline inférieure à 15 %

Bonne(s) réponse(s) : E

La correspondance entre les dérivations ECG et le siège d'un infarctus du myocarde est la suivante, sauf dans un cas. Lequel ?

A - D2 - D3 - VF : Infarctus inférieur
B - D 1 - VL - V5 - V6 : Infarctus latéral
C - D 1 - VL - V1 - V2- V3 : Infarctus septal profond
D - V1 - V2 - V3 : Infarctus antéro-septal
E - D2 - D3 - VF - V5 - V6 : Infarctus inféro-latéral

Bonne(s) réponse(s) : C

Un malade de 60 ans, par ailleurs asymptomatique, présente une polyadénopathie touchant l'ensemble des aires ganglionnaires superficielles et
faite de ganglions symétriques, indolores, mobiles, dépourvus de signes inflammatoires et de taille modérée.
Quel diagnostic envisageriez-vous en premier lieu ?

A - Adénopathies tuberculeuses
B - Adénopathies métastatiques d'un épithélioma
C - Maladie de Hodgkin
D - Leucose Iymphoïde chronique
E - Amygdalite

Bonne(s) réponse(s) : D

La(lesquelles) de ces complications peu(ven)t survenir dans l'évolution d'une leucémie myéloïde chronique :

A - Infarctus splénique
B - Priapisme
C - Crise de colique néphrétique
D - Compression médiastinale par adénopathie

E - Lithiase vésiculaire pigmentaire

Bonne(s) réponse(s) : A B C

A propos de la sclérose en plaques il est généralement admis que :

A - la maladie est rare dans les zones sub-tropicales
B - il existe une corrélation entre l'incidence de la maladie et les antigènes du système d'histo-compatibilité
C - une Iymphocytose modérée sans élévation de la protéinorachie est évocatrice
D - la première poussée ne survient habituellement pas après l'age de 50 ans
E - les troubles de l'oculo-motricité sont exceptionnels

Bonne(s) réponse(s) : A B C D

Chez un patient porteur d'une prothèse valvulaire mécanique en position mitrale, quelle est parmi ces 5 complications évolutives la plus fréquente ?

A - Endocardite bactérienne
B - Hémolyse
C - Désinsertion
D - Accidents thrombo-emboliques
E - Altération de la prothèse

Bonne(s) réponse(s) : D

Une anémie normochrome normocytaire régénérative peut être d'origine :

A - Inflammatoire
B - Hypoplasique
C - Hémorragique
D - Endocrinienne
E - Hémolytique

Bonne(s) réponse(s) : C E

Vous êtes appelé auprès d'un enfant de 7 ans pour fièvre, vomissements, érythème
maculopapuleux prédominant sur le tronc et angine érythémateuse diffuse. Vous
envisagez le diagnostic de scarlatine

Quelle(s) est(sont) la(les) complication(s) de cette maladie ?

A - Adénite mésentérique
B - Rhumatisme articulaire aigu
C - Acné
D - Glomérulonéphrite aiguë
E - Ostéomyélite aiguë

Bonne(s) réponse(s) : B D

A propos de la sclérose en plaques il est généralement admis que :

A - la maladie est rare dans les zones sub-tropicales
B - il existe une corrélation entre l'incidence de la maladie et les antigènes du système d'histo-compatibilité
C - une Iymphocytose modérée sans élévation de la protéinorachie est évocatrice
D - la première poussée ne survient habituellement pas après l'age de 50 ans
E - les troubles de l'oculo-motricité sont exceptionnels

Bonne(s) réponse(s) : A B C D

Le syndrome de Brown Sequard (atteinte de l'hémi moelle) comporte :

A - Un syndrome pyramidal homolatéral à la lésion
B - Des troubles de la sensibilité profonde bilatéraux
C - Des troubles de la sensibilité profonde homolatéraux au syndrome pyramidal
D - Une dissociation thermoanalgésique suspendue
E - Une abolition de réflexes homolatéraux à la lésion

Bonne(s) réponse(s) : A C

Le syndrome de Brown Sequard (atteinte de l'hémi moelle) comporte :

A - Un syndrome pyramidal homolatéral à la lésion
B - Des troubles de la sensibilité profonde bilatéraux
C - Des troubles de la sensibilité profonde homolatéraux au syndrome pyramidal
D - Une dissociation thermoanalgésique suspendue

E - Une abolition de réflexes homolatéraux à la lésion

Bonne(s) réponse(s) : A C

Un homme de 60 ans, insuffisant coronaire connu présente une dyspnée aiguë
avec cyanose, tachycardie régulière à 110/minute, tachypnée à 36/minute. L'auscultation met en évidence des râles inspiratoires fins aux deux bases pulmonaires et un bruit de galop gauche. Sa température est à 37,2 degrés.
Quel est votre diagnostic ?

A - Embolie pulmonaire
B - Pneumonie bilatérale
C - Broncho pneumonie
D - Oedème aigu du poumon
E - Insuffisance respiratoire aiguë chez un pulmonaire chronique

Bonne(s) réponse(s) : D

Chez un enfant en cours de traitement d'un R.A.A. vous retenez en faveur d'une
décision de diminution de la corticothérapie ?

A - Baisse de la VS
B - Baisse de la leucocytose
C - Baisse des antistreptokinases
D - Baisse des antistreptolysines
E - Le résultat du prélèvement de gorge

Bonne(s) réponse(s) : A

Les absences du petit mal :

A - Peuvent ne durer que quelques secondes
B - Peuvent se répéter un grand nombre de fois au cours d'une journée
C - S'accompagnent de pointes-ondes diffuses à l'EEG
D - Entraînent des perturbations électriques au rythme de 6 par seconde
E - Ont pour meilleur traitement la diphénylhydantoïne (Dihydan®)

Bonne(s) réponse(s) : A B C

Les absences du petit mal :

A - Peuvent ne durer que quelques secondes
B - Peuvent se répéter un grand nombre de fois au cours d'une journée
C - S'accompagnent de pointes-ondes diffuses à l'EEG
D - Entraînent des perturbations électriques au rythme de 6 par seconde
E - Ont pour meilleur traitement la diphénylhydantoïne (Dihydan®)

Bonne(s) réponse(s) : A B C

Le syndrome de Leriche est caractérisé de façon spécifique par :

A - Claudication intermittente serrée
B - Impossibilité d'érection stable chez l'homme
C - Hypertension artérielle
D - Douleurs de décubitus
E - Troubles trophiques des membres inférieurs

Bonne(s) réponse(s) : B

Lors d'une anémie par saignement chronique, quel est (quels sont) le(s) propositions vraies?

A - Fer sérique diminué
B - Volume globulaire moyen diminué
C - Transferrine sérique diminuée
D - Ferritine sérique diminuée
E - Vitamine B12 sérique diminuée

Bonne(s) réponse(s) : A B D

Le syndrome cordonal postérieur comporte :

A - Des signes pyramidaux
B - Un déficit des sensibilités lemniscates
C - Un déficit des sensibilités thermo-algiques
D - Des paresthésies
E - Une paralysie faciale centrale

Bonne(s) réponse(s) : B D

Parmi ces signes de déshydratation aiguë du nourrisson, quel(s) est(sont)

celui(ceux) qui évoquent une déshydratation intracellulaire ?

A - Pli cutané
B - Hypotension artérielle
C - Fièvre
D - Dépression de la fontanelle
E - Sécheresse des muqueuses

Bonne(s) réponse(s) : C.E.

Le syndrome cordonal postérieur comporte :

A - Des signes pyramidaux
B - Un déficit des sensibilités lemniscates
C - Un déficit des sensibilités thermo-algiques
D - Des paresthésies
E - Une paralysie faciale centrale

Bonne(s) réponse(s) : B D

Un patient souffre d'angor. A l'examen clinique, vous notez la présence de signes d'insuffisance ventriculaire gauche. Indiquez le (ou les) antiangineux
dont la prescription est déconseillée dans ce cas :

A - Trinitrine
B - Bêtabloquants
C - Amiodarone
D - Adalate (Nifédipine®)
E - Isoptine (Verapamil®)

Bonne(s) réponse(s) : B E

Indiquer, parmi les caractères suivants, celui qui est commun à toutes les anémies arégénératives :

A - Taux d'hémoglobine inférieur à 8 g/dl
B - Macrocytose
C - Réticulocytopénie
D - Sidérémie normale
E - Myélogramme de densité appauvrie

Bonne(s) réponse(s) : C

Parmi les médicaments anti-épileptiques suivants. quel(s) est celui(ou ceux) à utiliser dans le traitement des absences Petit Mal ?

A - Tégrétol® (Carbamazépine)
B - Dépakine® (acide Valproïque)
C - Zarontin® (Ethosuxinimide)
D - Dihydan® (phénytoïne)
E - Mysoline® (primidone)

Bonne(s) réponse(s) : B C

Parmi ces signes de déshydratation aiguë du nourrisson, quel(s) est(sont) celui(ceux) qui évoquent une déshydratation intracellulaire ?

A - Pli cutané
B - Yeux enfoncés et cernés
C - Fièvre
D - Soif
E - Sécheresse des muqueuses

Bonne(s) réponse(s) : C D E

Parmi les médicaments anti-épileptiques suivants. quel(s) est celui(ou ceux) à utiliser dans le traitement des absences Petit Mal ?

A - Tégrétol® (Carbamazépine)
B - Dépakine® (acide Valproïque)
C - Zarontin® (Ethosuxinimide)
D - Dihydan® (phénytoïne)
E - Mysoline® (primidone)

Bonne(s) réponse(s) : B C

L'angine de poitrine doit faire évoquer un spasme coronaire en cas de :

A - Survenue au cours de l'effort
B - Survenue au décours immédiat de l'effort
C - Survenue exclusivement nocturne
D - Répétition des crises à horaire fixe
E - Inefficacité de la Trinitrine

Bonne(s) réponse(s) : C D

Une carence en vitamine B12 peut s'observer dans les situations suivantes sauf
une, laquelle ?

A - Gastrectomie
B - Grossesse
C - Pullulation microbienne du grêle
D - Bothriocéphalose
E - Maladie de Biermer

Bonne(s) réponse(s) : B

Une déshydratation extra-cellulaire aiguë du nourrisson se manifeste typiquement par :

A - Une hypotension artérielle
B - Une soif vive
C - Une persistance du pli cutané abdominal
D - Une sécheresse du sillon gingivo-jugal
E - Des cernes sous-oculaires marqués

Bonne(s) réponse(s) : A C E

Des critères suivants, lequel (ou lesquels) n'appartient (ou n'appartiennent) pas
au syndrome néphrotique pur ?

A - Protéinurie supérieure à 3 g/24 heures
B - Protéines totales du sérum inférieures à 60 g/l
C - Oedèmes des membres inférieurs
D - Hypertension artérielle permanente
E - 10 000 - 50 000 GR/mn dans l'urine

Bonne(s) réponse(s) : D E

Quel examen est susceptible d'affirmer le diagnostic d'hépatite cytolytique ?

A - le dosage de la gamma-glutamytransférase sérique
B - le dosage de 5'nucléotidase sérique
C - le dosage de la bilirubine sérique
D - le dosage du taux des transaminases sériques
E - le dosage des phosphatases alcalines sériques

Bonne(s) réponse(s) :D
Quel cancer thyroïdien envisagez-vous devant l'association d'un nodule thyroïdien froid, d'une diarrhée, et une hypertension artérielle.

A - Cancer papillaire
B - Cancer vésiculaire
C - Cancer trabéculo-vésiculaire
D - Cancer médullaire
E - Cancer indifférencié

Bonne(s) réponse(s) : D

Une ulcération génitale, survenant chez un homme n'ayant jamais quitté la métropole, peut être d'origine :

A - Herpétique
B - Scabieuse
C - Amibienne
D - Brucellienne
E - Aphteuse

Bonne(s) réponse(s) : A B E

La clonidine (Catapressan®) possède le(les) effet(s) indésirable(s) suivant(s) :

1 - Effet presseur immédiat (par voie parentérale)
2 - Somnolence
3 - Sécheresse de la bouche
4 - Tachycardie réflexe

Compléments corrects : 1,2,3=A 1,3=B 2,4=C 4=D 1,2,3,4=E

Bonne(s) réponse(s) : A

Un syndrome néphrotique dit pur est caractérisé par toutes les propositions
suivantes sauf une. Laquelle ?

A - Un tracé d'immunoélectrophorèse "sélectif" de la protéinurie
B - L'absence d'hypertension artérielle
C - L'absence de lésions glomérulaires visibles en microscopie optique
D - L'absence de dépôts glomérulaires d'immunoglobulines
E - Un taux d'albumine plasmatique supérieur à 30 g/l

Bonne(s) réponse(s) : E

Parmi les complications suivantes, citez celle(s) qui peut (peuvent) être liée(s)) une pancréatite chronique :

A - ictère cholestatique
B - ascite
C - ulcère du bulbe
D - diabète
E - faux kyste du pancréas

Bonne(s) réponse(s) :ABCDE

L'étiologie de la diverticulose colique est caractérisée par tous les faits suivants sauf un, lequel ?

A - la prévalence varie avec l'âge, elle atteint 30% à 70 ans.
B - la prévalence varie selon la position géographique des pays
C - la prévalence est forte dans les pays à mode de vie occidentale
D - aucun facteur ethnique n'a été mis en évidence
E - la prévalence est égale dans les deux sexes

Bonne(s) réponse(s) :A

Parmi les thérapeutiques suivantes, on peut utiliser dans la maladie d'Addison :

A - Hydrocortisone
B - Cortancyl®
C - Cortisone
D - Synacthène®
E - Aucune de ces propositions

Bonne(s) réponse(s) : A C

Hydrargyrisme est diagnostiqué devant

A - Des tremblements
B - Un Syndrome cérébelleux
C - Polynévrite sensitivo motrice
D - Stomatite et gingivite

Bonne(s) réponse(s) :ABD

Parmi les traitements utilisables dans l'insuffisance cardiaque congestive, quel
est celui qui est formellement contre-indiqué ?

A - Digitaliques
B - Dérives nitrés
C - Bêta-bloqueurs
D - Diurétiques
E - Prasozine

Bonne(s) réponse(s) : C

Une insuffisance rénale chronique avec une créatininémie de 820 micromoles
par litre s'accompagne habituellement de :

A - Une hypokaliémie
B - Une fuite excessive de calcium urinaire
C - Une polyglobulie
D - Une hyperphosphorémie
E - Une augmentation de la vitesse de conduction nerveuse

Bonne(s) réponse(s) : D

M.A