

1) L'ASP est

a) un examen radiologique standard utiliser le plus souvent en 1ere intention

b) permet d'apprécier la répartition des gaz digestifs

c) permet de rechercher une aérobilie et des calcifications digestives

d) devant toute douleur abdominale

e) cliché réalisé uniquement en décubitus dorsal F

2) Par quel(s) moyen(s) technique(s) d'imagerie non invasive le diagnostic de calcul est facile

a) ASP en position couché

b) échographie abdominopelvienne

c) une bili IRM

endoscopie digestive F

QCS 3) Que traduit sémiologiquement l'image de niche en radiologie digestive

A) une ulcération

B) une lacune endoluminale F

C) une image d'addition

D) une réduction du calibre d'un segment digestif F

E) une image de compression extrinsèque F

4) En cas d'Abdomen aigu non traumatique le cliché thoracoabominale debout de face permet de :

A) rechercher un pneumo péritoine

B) éliminer une cardiomégalie

C) reconnaître un important épanchement compressif pleural

D) rechercher des calcifications pancréatiques

E) rechercher une surélévation en brioche de la coupole diaphragmatique

QCS 5) Devant un abdomen aigu, le cliché rénal en 1ere intention

A) un thorax face, couché F

B) un ASP couché

C) un thorax face, debout F

D) un thorax de profil F

E) un ASP debout

QCS 6) Un pneumopéritoine se manifeste sur un ASP debout par

A) de multiples niveaux hydroaérique

B) une opacité de tonalité hydrique

C) un croissant gazeux en projection sous diaphragmatique

D) une calcification des viscères pleins

E) un effacement de la ligne du Psoas
7) Sensibilité et spécificité de l'ASP reconnues pour des affections aiguës, lesquelles ?

- A) une pancréatite aiguë
- B) une cholécystite lithiasique ou alithiasique ϵ
- C) une affection utéro annexielles ϵ
- D) une péritonite avec pneumopéritoine

E) une occlusion intestinale
8) Quels sont les critères de bonne réussite de l'ASP :

- A) une bonne visibilité des bords externes des Psoas
- B) netteté des gaz intestinaux
- C) visibilité des 11èmes articulations costo-vertébrales ϵ
- D) visibilité du bord inférieur de la symphyse pubienne
- E) visibilité du bord supérieur de la symphyse pubienne

9) Le diagnostic d'un volvulus sur bride est évoqué sur un ASP debout

- A) Des niveaux hydro-aériques plus larges que hauts \times
- B) Des niveaux hydro-aériques plus hauts que larges
- C) Une image en U renversé
- D) Une pneumopéritoine ϵ

E) Une distension intestinale diffuse

10) Une clarté anormale sur un ASP

- A) une masse péritonéale
- B) un pneumopéritoine
- C) un cul de sac pleurale
- D) une aérobilie
- E) une aéroportie

11) Un ASP permet de mettre en évidence

- A) des signes de pancréatite
- B) des calcifications pancréatiques
- C) un pneumopéritoine
- D) des lithiases biliaires calcifiées
- E) toutes les réponses sont justes

12) Une sténose œsophagienne régulière centrée et rigide est en faveur :

- A) d'une sténose tumorale maligne

QCS

B) d'une sténose tumorale bénigne

C) d'une sténose caustique

D) toutes les réponses sont justes

E) toutes les réponses sont fausses

245 (13) Sur un transit du grêle la fistule se présente sous forme de :

A) une lacune

B) une image de soustraction

C) une image d'addition

D) une sténose

E) une dilatation

14) Le renforcement postérieur est caractériser par un milieu : cochez la ou les réponses justes

A) solide

B) semi liquide

C) gazeux

D) liquide

E) transonore

15) Quelles sont les contres indications de l'opacification par le sulfate de baryum : cochez la ou les réponses justes

A) une souffrance intestinale

B) une perforation digestive

C) une cholécystite aigue

D) une constipation chronique

E) une masse abdominale

(16) Les contres indications d'un uroscanner sont :

A) une insuffisance hépatique

B) une insuffisance rénale

C) une infection urinaire

D) une grossesse

E) une insuffisance cardiorespiratoire

245 (17) La principale indication de l'UCR est :

A) une lithiase rénale

B) une glomérulonéphrite

C) un reflux vésico-urétérale

D) un traumatisme rénale

E) une tumeur vésicale

(18) Sur un ASP le signe le plus fidèle d'un hématome rétropéritonéale est la présence de :

- A) un iléus reflexe
- B) un pneumopéritoine
- C) une grisaille diffuse
- D) une aérocolie

X E) un effacement des bords du Psoas

19) L'échographie abdominale est l'examen de choix pour rechercher

X A) un épanchement liquidien intrapéritonéale *neutre*

B) un épanchement gazeux intrapéritonéale (ASP)

C) des niveaux hydro-aérique (ASP)

D) un pneumopéritoine (ASP)

X E) un syndrome de masse intrapéritonéale

20) devant un tableau de colique néphrétique, quels sont les examens à faire en première intention

A) un uroscanner

X B) un ASP en position couché

C) une uro IRM

X D) une échographie abdominale