

# EMD 3 - Sémiologie (2014)

## Neurologie

**1 - Le syndrome de Guillain-Barré témoigne d'une atteinte pluri-radulaire se manifeste cliniquement par :**

- A. Une installation rapide des signes neurologiques
- B. Un déficit moteur des quatre membres avec conservation de la sensibilité superficielle et profonde
- C. Les muscles respiratoires ne sont jamais atteints
- D. Les réflexes ostéo tendineux sont vifs
- E. Association d'une hyperprotéinorachie avec élévation du nombre de leucocyte (association alburnunocytologique)

**2 - Le syndrome neurogène périphérique est caractérisé par la présence dans le territoire atteint :**

- A. D'une paralysie motrice flasque
- B. D'une paralysie motrice spastique
- C. C Des réflexes ostéotendineux vifs
- D. Des crampes avec des fasciculation
- E. De l'absence des troubles vasomoteurs

**3 - Le syndrome de la queue de cheval est une urgence chirurgicale se manifeste par la présence :**

- A. Des douleurs plan radiculaires des deux membres inférieurs
- B. Une paraplégie flasque complète des deux membres inférieurs.
- C. Abolition des réflexes rotuliens et achilleen
- D. Des réflexes ostéotendineux vifs avec signe de Babinski
- E. Anesthésie en selle avec incontinence urinaire et anale

**4 - Une section médullaire complète post traumatique se traduit cliniquement au stade du choc spinal par :**

- A. Une paraplégie ou une tétraplégie flasque
- B. Une anesthésie totale au dessous de la lésion
- C. Troubles sphinctériens avec rétention des selles et des urines
- D. La présence des réflexes de défenses
- E. Une hypertonie pyramidale

**5 - Le syndrome de Brown-Séquard est secondaire à l'atteinte d'une héli moelle traduit par :**

- A. Du côté de la lésion d'un syndrome pyramidal et un syndrome cordonal postérieur
- B. Du côté de la lésion d'un syndrome pyramidal et un syndrome spino thalamique
- C. Du côté opposé de la lésion un syndrome cordonal postérieur
- D. Du côté opposé de la lésion un syndrome spino thalamique
- E. La présence de troubles sphinctériens

**6 - Le syndrome de la commissure grise témoigne d'une lésion du centre de la moelle se manifeste au cours de la syringomyélie par :**

- A. Des douleurs spinothalamique
- B. Des troubles trophiques
- C. Une aréflexie
- D. Une paralysie flasque
- E. Une paralysie spastique

**7 - L'atteinte de la racine C6 se manifeste par :**

- A. Une douleur du cou de la face postérieure du bras de l'avant bras du médus de l'index
- B. Une douleur du cou de l'épaule la face externe du bras et de l'avant bras
- C. Une amyotrophie du deltoïde
- D. Une impossibilité a réalisé la flexion de l'avant bras sur le bras
- E. Une impossibilité a réalisé une abduction du bras

## Dermatologie

**17 - Quelle(s) est (sont) la ou les propositions justes :**

- A. Une vésicule est une lésion taille supérieure à 1 cm
- B. L'eczéma et la varicelle sont des dermatoses bulleuses
- C. Ulcération est une perte de substance superficielle
- D. Un nodule est une lésion liquidienne.
- E. Une lésion noire doit être contrôlée vue le risque évolutif

**18 - Le psoriasis est une dermatose fréquente en dermatologie ; classée comme :**

- A. Des lésions vésiculeuses.
- B. Des lésions pustuleuses.
- C. Des lésions érythémato-squameuses.
- D. Des lésions nodulaires.
- E. Avec une évolution chronique

**19 - L'acné est une :**

- A. Pustule microbienne
- B. Pustule microbienne
- C. Une pathologie hormonale
- D. Atteint l'adulte jeune
- E. Touche les 02 sexes

## Appareil locomoteur

**20 - L'examen de la mobilité articulaire :**

- A. Doit se faire avec douceur
- B. N'ai pas très important lors de l'examen clinique
- C. Doit comporter des mensurations
- D. Doit se faire en actif mais pas en passif
- E. Doit être complété par l'examen de la mobilité contrariée

**21 - Le caractère « inflammatoire » de la douleur rhumatismale signifie que: (une seule réponse)**

- A. Elle apparaît aux efforts intenses
- B. Elle est maximale en fin de journée
- C. Le patient souffre pendant la première moitié de la nuit
- D. Le patient souffre pendant la deuxième moitié de la nuit
- E. Elle est calmée par le repos et cède à-la mobilisation

**22 - Les deux principales causes de la gêne fonctionnelle sont :**

- A. L'œdème
- B. La douleur
- C. La rougeur
- D. La chaleur
- E. La raideur

**23 - Concernant les rhumatismes, cochez la ou les réponses just parmi les suivantes :**

- A. Ils mettent souvent en jeu le pronostic vital
- B. Ils compromettent rarement le pronostic fonctionnel
- C. Ils peuvent être dégénératifs ou inflammatoires
- D. Ils n'ont pas de traitement spécifique
- E. Ils n'atteignent que les adultes

**24 - Quels sont les différents examens qui n'ont pas de place dans l'examen clinique ostéo-articulaire (cocher la ou les réponses juste (s)) :**

- A. L'examen des muscles
- B. L'examen des artères, des veines et des ganglions lymphatiques
- C. L'examen neurologique
- D. L'examen viscéral
- E. Aucune de ces réponses

## Gynécologie

**25 - La dysménorrhée est :**

- A. Une douleur qui survient lors rapports sexuels.
- B. Une douleur qui survient lors des règles
- C. Une douleur qui survient en milieu de cycle
- D. Une douleur des seins
- E. Une douleur qui survient pendant l'accouchement.

**26 - Le premier temps de l'examen gynécologique est :**

- A. Le toucher vaginal.
- B. L'examen des seins.
- C. L'échographie.
- D. L'examen périnéal
- E. Le toucher rectal

**27 - Les métrorragies sont :**

- A. Des saignements d'origine utérine.
- B. Sont des règles d'abondance très importante
- C. Surviennent entre les règles
- D. S'arrêtent après la ménopause.
- E. Peuvent être liées à la présence d'un fibrome utérin

**28 - Pour faire un frottis cervico-vaginal de dépistage il faut : CM**

- A. Les femmes ménopausées sont traitées localement par une progestérone thérapie
- B. Avoir mis le spéculum sans lubrifiant
- C. Avoir mis le spéculum avec lubrifiant
- D. Avoir fait un toucher vaginal avant
- E. Moucher le col avec une compresse pour le débarrasser de la glaire

**29 - La glaire cervicale normale est au 14<sup>o</sup> jour du cycle : CM**

- A. Abondante, transparente
- B. Épaisse, gélatineuse
- C. Le col est fermé
- D. Le col est ouvert
- E. La cristallisation se fait en feuille de fougère

**30 - Chez la femme ménopausée :**

- A. La survenue de métrorragies tait rechercher un cancer de l'endomètre
- B. L'examen des sains est systématique
- C. Il existe une sécheresse vaginale liée à une augmentation de la sécrétion d'œstrogène
- D. Les ménorragies peuvent être fonctionnelles
- E. La courbe de température est biphasique

**31 - La courbe ménothermique :**

- A. Consiste en la prise de la température rectale tous les matins
- B. Lorsqu'elle est biphasique, elle témoigne de la présence d'ovulation
- C. Le plateau thermique normal de cinq jours
- D. Doit être débutée le premier jours
- E. Est réalisée dans le cadre d'un bilan d'infertilité

**32 - L'examen de la femme enceinte :**

- A. Comprend un examen au spéculum
- B. Comprend la mesure de la haute utérine
- C. Comprend le toucher rectal systématique
- D. Comprend la prise du poids
- E. La prise de la tension artérielle n'est.pas systématique

**33 - Pendant une grossesse normal :**

- A. La courbe ménothermique montre un plateau qui se prolonge au-delà de dix jours
- B. La prise du poids est de 1 Kg par moi
- C. Les mouvements actifs foetaux peut être perçus dès 10 semaines.
- D. La palpation de l'abdomen permet de repérer la position foetale
- E. La survenue de saignement est normale

**34 - L'échographie obstétricale :**

- A. Permet si elle est faite à temps de dater la grossesse
- B. Juge de la position du foetus
- C. Estime le nombre de foetus
- D. Permet d'apprécier la quantité de liquide amniotique
- E. Détermine le siège du placenta

**35 - Le taux de BHCG plasmatique :**

- A. Est demandé pour confirmer une grossesse
- B. Il dose la fraction B de l'HCG
- C. Il est moins spécifique que le dosage urinaire
- D. Il est très élevé en cas de grossesse arrêtée
- E. Le prélèvement est fait à partir des urines du matin

**36 - L'examen des seins :**

- A. Se fait de préférence au 10<sup>ème</sup> des règles
- B. Se fait en cas de signes d'appel
- C. Ne fait pas partie de l'examen gynécologique
- D. Permet de diagnostiquer des tumeurs du sein
- E. Se fait uniquement sur une femme en décubitus dorsal.

**37 - La gynécomastie :**

- A. C'est la présence d'un écoulement sanguinolent du mamelon.
- B. C'est la présence d'un écoulement de lait du mamelon.
- C. C'est l'hypertrophie de la glande mammaire
- D. C'est la présence de douleurs du sein
- E. Peut se voir même chez l'homme

**38 - La galactorrhée :**

- A. C'est la présence d'un écoulement sanguinolent du mamelon
- B. C'est la présence d'un écoulement de lait du mamelon
- C. C'est l'hypertrophie de la glande mammaire
- D. C'est la présence de douleurs du sein
- E. Peut se voir même chez l'homme

**39 - La mammographie :**

- A. C'est un examen échographique des seins.
- B. C'est l'examen de dépistage de référence pour le cancer du sein
- C. Permet de diagnostiquer des tumeurs infra-clinique du sein
- D. Se fait de préférence chez la femme jeune avant 30 ans
- E. Comprend la réalisation d'un seul cliché

**40 - L'échographie mammaire :**

- A. C'est un examen échographique des seins.
- B. C'est l'examen de dépistage de référence pour le cancer du sein
- C. Permet de diagnostiquer les kystes du sein
- D. Se fait de préférence chez la femme jeune avant 30 ans
- E. Comprend la réalisation d'un seul cliché