

## EMD 3 - Sémiologie (2015)

### Dermatologie

**16 - L'examen clinique en dermatologie doit comporter surtout :**

- A. La demande d'une biopsie cutanée en première intention
- B. Une mise à nu du malade normalement.
- C. Une bonne inspection.
- D. Une percussion.
- E. Un examen des autres appareils

**17 - Quelle(s) est (sont) la ou les propositions justes :**

- A. Une vésicule est une lésion de taille supérieure à 1 cm
- B. L'eczéma et la varicelle sont des dermatoses bulleuses
- C. Ulcération est une perte de substance superficielle
- D. Un nodule est une lésion liquidienne
- E. Une lésion noire doit être contrôlée vue le risque évolutif.

**18 - L'acné est une :**

- A. Pustule
- B. Sur un fond de séborrhée
- C. Une pathologie hormonale
- D. Atteint l'adulte jeune
- E. Touche les 02 sexes

### PSYCHIATRIE

**19 - L'examen psychiatrique :**

- A. est basé sur l'écoute du discours du patient
- B. le médecin ne doit jamais poser de question
- C. l'examen biologique est indispensable pour poser le diagnostic de l'affection psychiatrique
- D. l'examen somatique est indispensable
- E. le patient atteint de troubles mentaux ne demande jamais une consultation psychiatrique

**20 - Parmi les symptômes suivants quel(s) est (sont), celui (ceux) qui sont dus à un trouble du fonctionnement de la pensée :**

- A. barrage
- B. tachypsychie
- C. les obsessions
- D. délire
- E. voyeurisme

# Gynécologie

## 21 - La mastodynie est :

- A. Une douleur qui survient lors des rapports sexuels
- B. Une douleur qui survient lors des règles
- C. Une douleur qui survient en milieu de cycle.
- D. Une douleur des seins.
- E. Une douleur qui survient pendant l'accouchement.

## 22 - Le premier temps de l'examen gynécologique est :

- A. Le toucher vaginal.
- B. L'examen des seins
- C. L'échographie.
- D. L'examen périnéal.
- E. Le toucher rectal.

## 23 - Les ménorragies sont :

- A. Des saignements d'origine vésicale
- B. Sont des règles d'abondance très importante
- C. Surviennent entre les règles
- D. S'arrêtent après la ménopause
- E. Peuvent être liées à la présence d'un kyste ovarien

## 24 - L'examen des seins :

- A. Se fait de préférence au 10<sup>e</sup> jour des règles
- B. Ne se fait pas en cas de signes d'appel
- C. Fait partie intégrante de l'examen gynécologique
- D. Permet de diagnostiquer des tumeurs du sein
- E. Se fait uniquement sur une femme en décubitus dorsal

## 25 - La gynécomastie :

- A. C'est la présence d'un écoulement sanguinolent du mamelon
- B. C'est la présence d'un écoulement de lait du mamelon
- C. C'est l'hypertrophie de la glande mammaire
- D. C'est la présence de douleurs du sein
- E. Peut se voir même chez l'homme

**26 - La galactorrhée :**

- A. C'est la présence d'un écoulement sanguinolent du mamelon
- B. C'est la présence d'un écoulement de lait du mamelon
- C. L'hypertrophie de la glande mammaire
- D. C'est la présence de douleurs du sein
- E. Peut se voir même chez l'homme

**ORL**

**27 - La rhinoscopie antérieure, c'est l'examen : (RJ)**

- A. des fosses nasales
- B. des fosses nasales et du cavum
- C. réalisé à l'aide d'une source lumineuse et d'un spéculum nasal.
- D. permettant d'apprécier l'état de l'orifice de la trompe d'Eustache
- E. permettant d'apprécier l'état de la muqueuse des cornets, des méats, de la cloison avec sa tache vasculaire

**28 - Concernant la rhinorrhée, quelles sont les propositions justes ?**

- A. C'est l'écoulement de liquide par le nez
- B. Elle peut être muqueuse au cours d'une rhinite virale.
- C. Elle peut être purulente bilatérale, au cours d'une rhinite infectieuse
- D. Elle peut être purulente unilatérale au cours d'un corps étranger nasal.
- E. Elle peut être sanglante. au cours d'un cancer ou d'un traumatisme

**29 - la dysphonie est : (RJ)**

- A. un trouble de l'émission vocale
- B. un trouble de la déglutition
- C. un trouble de la parole
- D. un trouble du langage
- E. un trouble de la respiration

**30 - L'examen clinique du larynx comporte : (RJ)**

- A. La laryngoscopie indirecte
- B. La laryngoscopie directe
- C. La recherche de la mobilité laryngée
- D. La recherche du signe de Collet
- E. La recherche du signe de Souques

## Neurologie

**31 - L'hypertension intracrânienne chez l'adulte se manifeste cliniquement par :**

- A. Céphalée en casque
- B. Vomissement en jets
- C. Une baisse de l'acuité visuelle
- D. Une exophtalmie
- E. Un signe de Kernig positif

**32 - Les diagnostics étiopathogéniques pouvant engendrer une hypertension intracrânienne sont :**

- A. Une hydrocéphalie
- B. Une craniosténose
- C. Une sclérose en plaque,
- D. Une prolifération néoplasique intracrânienne
- E. Une fistule du LCR

**33 - La ponction lombaire est contre-indiquée en cas d'hypertension intracrânienne du fait que :**

- A. Il y a un risque de fistule du LCR
- B. Elle expose au risque d'engagement des amygdales cérébelleuses dans le trou occipital
- C. Il y a un risque d'engagement temporal
- D. Il y a un risque d'engagement sous la faux du cerveau;
- E. Il y a un risque d'hémorragie sous arachnoïdienne

**34 - Le tonus musculaire est :**

- A. Un état de décontraction musculaire
- B. Un état de contraction permanent du muscle
- C. Un déséquilibre entre les voies activatrices et inhibitrices
- D. Apprécié par le ballant de la main

**35 - La force musculaire globale s'explore par :**

- A. Le diapason
- B. Le testing musculaire
- C. La manoeuvre de Mingazzini
- D. Le signe de Romberg

**36 - Le syndrome neurogène périphérique est caractérisé par :**

- A. une hypertonie
- B. une paralysie flasque
- C. des réflexes ostéotendineux présents
- D. des troubles moteurs

**37 - Le syndrome pyramidal se manifeste par :**

- A. une hypertonie spastique
- B. une hypertonie plastique
- C. des réflexes ostéotendineux vifs, diffusés
- D. des réflexes ostéotendineux pendulaires

**38 - Le syndrome pyramidal se manifeste par :**

- A. un cutané plantaire en flexion
- B. une exagération du réflexe myotatique
- C. un cutané plantaire en extension
- D. des signes hémisphériques du même côté de la lésion

**39 - Les principaux signes du syndrome extrapyramidal sont :**

- A. un tremblement d'attitude
- B. une hypertonie spastique
- C. une akinésie
- D. un tremblement de repos

**40 - L'aphasie de BROCA est caractérisé par :**

- A. une logorrhée
- B. une réduction du langage
- C. une lésion hémisphérique gauche
- D. une lésion hémisphérique droite

**41 - L'apraxie idéomotrice est :**

- A. un trouble de la manipulation des objets
- B. est l'impossibilité de dessiner des formes géométriques
- C. un trouble de la manipulation sans objets
- D. c'est la perte de la capacité taxinomique

**42 - Une hémiplégie gauche associée à une baisse de l'acuité visuelle de l'oeil droit évoque :**  
(cochez la réponse juste) :

- A. Une hémorragie cérébrale
- B. Une lésion de l'artère sylvienne
- C. Une lésion de l'artère carotide interne droite
- D. Une lésion du tronc cérébral

**43 - Dans le syndrome de Wallenberg on peut retrouver du côté de la lésion :** (Cochez la réponse fausse)

- A. Un hémisyndrome cérébelleux
- B. Un Claude-Bernard-Horner
- C. Une hémianesthésie respectant la face
- D. Une atteinte des nerfs mixtes

**44 - On évoque un syndrome lacunaire devant :** (cochez la réponse fausse)

- A. Une hémianesthésie pure
- B. Une hémiparésie + ataxie
- C. Une hémiplégie motrice pure
- D. Un syndrome de Claude-Bernard-Horner

**45 - Une sténose carotidienne peut être à l'origine :** (cochez la réponse fausse)

- A. D'une cécité monoculaire ipsilatérale transitoire
- B. Une diplopie
- C. Un souffle cervical
- D. Un trouble sensitif controlatéral.

**46 - Le tremblement cérébelleux :**

- A. Est de grande amplitude
- B. Est un tremblement de repos
- C. Aggraver par l'effort
- D. Le patient semble compter sa monnaie, ou rouler une cigarette
- E. Symétrique intéressant beaucoup plus les extrémités

**47 - Le signe de ROMBERG appartient au syndrome :**

- A. Pyramidal
- B. Cordonal postérieur
- C. Cérébelleux
- D. Vestibulaire
- E. Syndrome de Brown-Séquard

**48 - En cas de syndrome vestibulaire périphérique le nystagmus :**

- A. Est constant (existe toujours)
- B. Bat du côté de la lésion.
- C. Bat du côté opposé à la lésion.
- D. Accompagner toujours à un vertige
- E. Est de type horizontal

**49 - Adiadicocinésie :**

- A. Est l'impossibilité d'exécuter des mouvements rapides alternatifs
- B. Est l'impossibilité de démarrer le mouvement à temps (retard d'exclusion)
- C. Est l'impossibilité de se maintenir debout les yeux fermés
- D. Est l'impossibilité de coordonner la parole
- E. Aucune réponse juste

**50 - La dyschronométrie :**

- A. Est un trouble d'exécution des mouvements volontaires dans l'espace
- B. Est un trouble d'exécution des mouvements volontaires dans le temps
- C. Est un signe d'ataxie cérébelleuse
- D. Est un signe d'atteinte vestibulaire
- E. Est similaire à dysarthrie