

Université de Tiemcen

le 05/06/2013

Faculté de médecine

3<sup>ème</sup> EMD de sémiologie

Nom et prénom.....

Date de naissance.....

- 1) - L'ostéomalacie : (la ou les réponses justes)
  - a- Est due à l'augmentation de la porosité osseuse
  - \*b- Est souvent sensible à la vitamine D
  - \*c- Peut se compliquer de fractures osseuses
  - d- Les douleurs osseuses y sont rares
  
- 2) - L'origine de l'ostéomalacie peut être : (la ou les réponses justes)
  - a- Traumatique
  - \*b- Rénale
  - \*c- Carencielle
  - d- Hépatique
  
- 3) - L'ostéomalacie se manifeste par les symptômes suivants : (la ou les réponses justes)
  - a) Le steppage à la marche (déficit des releveurs des pieds)
  - \*b) Des douleurs osseuses diffuses
  - c) Des céphalées
  - \*d) Des déformations osseuses
  
- 4) - Le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter comprend les signes suivants : (la ou les réponses justes)
  - a) une cystite
  - \*b) une arthrite
  - \*c) une conjonctivite
  - d) une rectite
  
- 5) - La goutte est : (la ou les réponses justes)
  - a) Une arthrite dégénérative
  - b) Elle est due à l'augmentation du taux d'urate de calcium dans le sang
  - c) Menace les reins
  - d) Evolue par crises au début
  
- 6) - La polyarthrite rhumatoïde : (la ou les réponses justes)
  - \*a) Entraîne des déformations des doigts
  - b) Est un rhumatisme métabolique
  - \*c) Se caractérise par la présence du facteur rhumatoïde
  - d) Touche le plus souvent les hommes

164

7) L'apraxie est une désorganisation : (la réponse juste)

- a- Du langage
- b- Du champ perceptif
- c- Du champ d'action
- d- De la mémoire

8) L'aphasie de BROCA est caractérisée par : (la réponse juste)

- a- Une absence de réduction du langage
- b- Une compréhension perturbée
- c- Réduction du langage
- d- Une atteinte hémisphérique droite

9) Le rythme de cheynes stockes est une : (la réponse juste)

- a- hyperpnée rapide
- b- inspiration profonde avec apnée
- c- hyperpnée rapide avec apnée
- d- lésion de la protubérance.

10) l'étude de la force musculaire aux membres supérieurs s'explore par : (la réponse juste)

- a- la manœuvre de mingazzini
- b- la manœuvre de Stewart Holmes
- c- la manœuvre du ballant de la main
- d- la manœuvre de barre

11) Les hypertonies sont : (la ou les réponses justes)

- a- d'origines périphériques
- b- accompagnées d'une hyporéflexie
- c- accompagnées d'une hyperreflexie
- d- d'origine centrale

12) l'hypertonie plastique est une : (la ou les réponses justes)

- a- rigidité élastique
- b- rigidité en tuyau de plomb
- c- hypotonie centrale
- d- s'accompagne d'une exagération des réflexes de posture

13) L'anosmie est : (la réponse juste)

- a- Une baisse de l'audition
- b- Une baisse de l'acuité visuelle
- c- Une perte de l'odorat
- d- Une baisse de l'odorat

14) L'amblyopie se définit : (la réponse juste)

- a- Une cécité
- b- Une amputation du champ visuel
- c- Un scotome
- d- Une baisse de l'acuité visuelle X

15) Le nerf oculomoteur commun innerve les muscles suivants : (la ou les réponses justes)

- a- Le droit supérieur X
- b- Le droit externe
- c- Le grand oblique
- d- Le droit interne X

16) La paralysie de la motricité oculaire intrinsèque se caractérise : (la ou les réponses justes)

- a- Un ptosis X
- b- Un strabisme
- c- Une abolition du réflexe photo-moteur et de l'accommodation
- d- Une mydriase X

17) L'atteinte du nerf pathétique se manifeste : (la ou les réponses justes)

- a- Une mydriase unilatérale
- b- Une diplopie verticale
- c- Une diplopie horizontale X
- d- Un strabisme interne X

18) La branche motrice du nerf trijumeau innerve : (la ou les réponses justes)

- a- La branche ophtalmique
- b- La branche maxillaire inférieure X
- c- Les muscles masséters X
- d- Les muscles ptérygoïdiens X

19) L'atteinte de la branche motrice du nerf trijumeau se caractérise : (la ou les réponses justes)

- a- Des douleurs au niveau de la face
- b- Une chute de la mâchoire inférieure X
- c- Un signe du peaucier du cou de Babinski
- d- Une diminution du larmoiement

20) Le réflexe cornéen dépend de deux voies innervées par les nerfs suivants : (la ou les réponses justes)

- a- L'oculomoteur commun X
- b- Le trijumeau X
- c- Le facial X
- d- Le pathétique

165

21) La paralysie faciale centrale se caractérise : (la réponse juste)

- a- Une atteinte du territoire facial supérieur et inférieur
- b- Une atteinte du territoire facial supérieur
- c- Une atteinte du territoire facial inférieur
- d- Un signe de Charles Bell

22) L'atteinte du nerf spinal se manifeste : (la ou les réponses justes)

- a- Une atteinte des muscles trapèzes
- b- Une paralysie de la langue
- c- Des troubles de la phonation et la déglutition
- d- Une atteinte des muscles sterno-cléido-mastoïdiens

23) Le syndrome de Guillain-Barré témoigne d'une atteinte pluri radiculaires se manifeste cliniquement par : (la ou les réponses justes)

- a- Une installation rapide des signes neurologiques
- b- Un déficit moteur des quatre membres avec conservation de la sensibilité
- c- Pas d'atteinte des muscles respiratoires
- d- Les réflexes tendineux sont vifs
- e- Association d'une hyperprotéinorachie avec élévation du nombre de cellule

24) Le syndrome neurogène périphérique est caractérisé par la présence dans le territoire atteint : (la ou les réponses justes)


- a- D'une paralysie motrice flasque
- b- D'une paralysie motrice spastique
- c- Des réflexes ostéo-tendineux vifs
- d- Des crampes avec des fasciculation
- e- Absence de troubles sensitifs

25) Le syndrome de la queue de cheval est une urgence chirurgicale se manifeste par la présence : (la ou les réponses justes)

- a- Des douleurs pluri radiculaires des deux membres inférieurs
- b- Une paraplégie flasque complète des deux membres inférieurs
- c- Une para paralysie des deux membres inférieurs
- d- Des réflexes vifs avec Babinski
- e- Anesthésie en selle avec incontinence urinaire et anale

26) Une section médullaire complète post-traumatique se traduit cliniquement au stade de choc médullaire par : (la ou les réponses justes)

- a- Une paraplégie ou une tétraplégie flasque
- b- Une anesthésie totale au dessous de la lésion
- c- Troubles sphinctériens avec rétention des selles et des urines
- d- La présence des réflexes de défenses
- e- Une hypertonie pyramidale



27) Le syndrome de Brown-Séguard est secondaire à l'atteinte d'une hémimoelle se traduit par : (la ou les réponses justes)

- a- Du côté de la lésion : d'un syndrome pyramidal et un syndrome cordonal postérieur
- b- Du côté de la lésion : d'un syndrome pyramidal et un syndrome spinothalamique
- c- Du côté opposé de la lésion conservation de la sensibilité et de la motricité
- d- Du côté opposé de la lésion un syndrome spinothalamique
- e- La présence de troubles sphinctériens

28) Le syndrome de la commissure grise témoigne d'une lésion du centre de la moelle est caractérisé par : (la ou les réponses justes)

- a- Des douleurs spinothalamique
- b- Des troubles trophiques
- c- Une aréflexie
- d- Une paralysie flasque
- e- Une paralysie spastique

29) L'Examen Clinique en Gynéco-Obstétrique : (la réponse juste)

- a- Doit Préciser Les ATCD Physiologiques.
- b- Doit Préciser les ATCD Pathologiques.
- c- Doit préciser les ATCD Les signes fonctionnels.
- d- Doit préciser les ATCD pathologiques et les signes fonctionnels.
- e- Doit préciser les ATCD pathologiques et les signes fonctionnels les ATCD physiologiques

30) Dans Les ATCD Obstétricaux, Un Seul Élément Ne Doit Pas Être Précisé Lequel :

- a- Le nombre de geste et de parité. ✓
- b- Nombre d'avortement. ✓
- c- Nombre d'accouchement prématuré. ✓
- d- Le nombre d'enfant mort né.
- e- La prise de contraception Hormonale.

31) Le Cycle menstruel se divise en plusieurs phase sauf une : (la réponse fausse)

- a- La phase pré ovulatoire du 5<sup>ème</sup> au 14<sup>ème</sup> j. ✓
- b- La phase proliférative du 5<sup>ème</sup> au 14<sup>ème</sup> j. ✓
- c- La phase d'ovulation qui se situe entre du 10<sup>ème</sup> et le 14<sup>ème</sup> j. ✓
- d- La phase post-ovulatoire du 17<sup>ème</sup> au 28<sup>ème</sup> j. ✓
- e- La phase de la menstruation du 1<sup>er</sup> jour au 5<sup>ème</sup> jour. ✓

32) Les Signes de la puberté sont caractérisés par sauf un : (la réponse fausse)

- a- Apparaissent vers l'âge de 10-11 ans.
- b- Apparaissent vers l'âge de 18 - 20ans. ✓
- c- Développement mammaire vers l'âge de 12-13 ans.
- d- La pilosité pubienne et axillaire se complète 2à3 ans après.
- e- La menstruation primaire se produit deux ans après.

33) Dans les ATCD pathologiques on recherche sauf un : (la réponse fausse)

- a- Les interventions chirurgicales.
- b- La notion d'hystérectomie et de kystectomie.
- c- Les pertes vaginales.
- d- L'accouchement normal x
- e- La date des dernières règles.

34) Dans l'examen en gynécologie on recherche tous les signes sauf un : (la réponse fausse)

- a- La douleur pelvienne.
- b- Les leucorrhées.
- c- Les pertes verdâtres.
- d- Les ménométrorragies.
- e- La douleur abdominale.

35) Les hémorragies génitales sont caractérisées par sauf un : (la réponse fausse)

- a- Des métrorragies.
- b- Des ménorragies.
- c- Des ménométrorragées.
- d- Des règles menstruelles.
- e- La rupture d'une grossesse extra utérine.

36) L'Examen Au Speculum permet de rechercher l'état du col Sauf : (la réponse fausse)

- a- L'aspect du col.
- b- La situation centrale ou déviée latéralement.
- c- Une érosion, une ulcération ou une tumeur bourgeonnante.
- d- Une tumeur de l'ovaire.
- e- Une déchirure cervicale.

37) Le Toucher vaginal : (la réponse fausse)

- a- Précède le toucher rectal.
- b- Recherche l'état du col, sa direction, sa consistance et son volume.
- c- Apprécie sa forme et ses irrégularités.
- d- Précède l'examen au speculum.
- e- Apprécie l'état des culs de sac vaginaux et leur souplesse.

38) l'exploration instrumentale en gynécologie se fait par sauf un : (la réponse fausse)

- a- Le curetage biopsique.
- b- Biopsie du col.
- c- L'échographie instrumentale.
- d- L'hystérocopie.
- e- La coelioscopie.

39) l'examen des seins se fait : sauf un (la réponse fausse)

- a- En position assise, bras pendants.
- b- Par la mammographie et l'échographie mammaire.
- c- Examen quadrant par quadrant des seins.
- d- Rechercher l'aire ganglionnaire axillaire.

40) l'examen des seins est complété par sauf: (la réponse fausse)

- a- Une cytoponction.
- b- Une mammographie.
- c- Un examen gynécologique.
- d- Un examen histologique extemporané.
- e- Une échographie abdominale X

41) Un seul des signes suivants ne fait pas partie du score d'apgar lequel? (la réponse fausse)

- a- respiration
- b- fréquence cardiaque
- c- cri
- d- réactivité
- e- coloration

42) Le score d'Appgar mesure les paramètres suivants à l'exception de: (la réponse fausse)

- a- la fréquence cardiaque du nouveau né
- b- la coloration cutanée
- c- la respiration
- d- les reflexes ostéo-tendineux
- e- tonus musculaire

43) Parmi les reflexes archaïques qu'on retrouve chez le nouveau-né on a: (la réponse fausse)

- a- le reflexe de succion
- b- le reflexe d'agrippement des doigts ou grasping
- c- le reflexe de Moro
- d- le reflexe de Ballard
- e- le reflexe d'allongement croisé

44) On recherche la luxation congénitale de la hanche par: (la réponse fausse)

- a- la manœuvre de Bartolini
- b- la manœuvre d'Ortolani
- c- la manœuvre de Barlow
- d- la flexion des cuisses sur le bassin
- e- la recherche du craquement lors de la flexion de la cuisse sur le bassin

45) L'examen neurologique du nouveau-né note: (la réponse juste)

- a- une hypertonie axiale et périphérique
- b- une hypertonie axiale et une hypotonie périphérique
- c- une hypotonie axiale et une hypertonie périphérique
- d- une hypotonie axiale et périphérique
- f- toutes les réponses sont fausses

46) Parmi les malformations qu'on doit rechercher chez le nouveau-né on a: (la réponse fausse)

- a- la spina bifida ou anomalie de fermeture du tube neural

167

- b- la luxation congénitale de la hanche
- c- les pieds bots
- d- l'atrésie de l'œsophage
- e- l'hypotonie axiale

47) parmi les symptômes de l'ostéoporose (la ou les réponses justes):

- a- Déminéralisation osseuse
- b- Douleur a type de lombalgie
- c- Fractures: vertèbres, col de fémur, poignet
- d- Déformations osseuses
- e- Épanchements articulaires

48) Quel est le signe radiologique standard permettant de suspecter une hernie discale ? (la réponse juste)

- a- Pincement discal postérieur
- b- condensation des plateaux vertébraux
- c- ostéophytose antérieure
- d- Tassement vertébral
- e- osteo condensation sous-chondrale

49) Concernant la névralgie sciatique de type S1 une réponse est fausse laquelle ? (la réponse fausse)

- a- aréflexie rotulienne
- b- aréflexie achilléenne
- c- hypotonie du mollet
- d- hypoesthésie du bord externe du pied
- e- difficulté à se tenir sur le talon

50) parmi les facteurs de risque de l'ostéoporose. (les réponses justes)

- a- Manque d'exercices physiques
- b- Consommation abondantes de caféines
- c- Manque de vitamine D
- d- Alcoolisme
- e- tabagisme