

Examen d'épidémiologie Avril 2016 «partie pratique»

Noms : Prénoms :

Code : ne rien écrire

Code : ne rien écrire

1. Le protocole d'une étude :

- a. Est un document écrit avant la réalisation de l'étude
- b. Est un document écrit après la réalisation de l'étude
- c. Est un document écrit avant la réalisation de l'étude et corrigé après
- d. Est le rapport de l'enquête qui est rédigé avant la réalisation de l'étude
- e. et le rapport de l'enquête qui est rédigé après la réalisation de l'étude

2. La recherche documentaire

- a. se fait dans la phase préliminaire seulement
- b. se fait dans la phase de planification seulement
- c. permet de connaître les Aspects peu étudiés du sujet
- d. Elle s'appuie sur la littérature grise
- e. est une opération permanente qui va au-delà de la rédaction du rapport final.

3. dans la norme de Vancouver

- a. les références sont numérotées selon l'ordre alphabétique
- b. les références sont numérotées selon l'ordre de leur première apparition dans le texte
- c. les références sont numérotées selon l'ordre de leur première apparition dans le texte
- d. les références sont numérotées selon l'ordre alphabétique de leur première apparition dans le texte
- e. les références sont numérotées selon le type d'étude

4. les résultats d'une étude sont interprétés dans la partie "Discussion"

Vrai

faux

5. Un rapport d'enquête est présenté dans l'ordre suivant:

- a. Titre, Introduction, résumé, matériels et méthodes, résultats, discussion, référence.
- b. Titre, résumé, Introduction, matériels et méthodes, résultats, discussion, référence.
- c. titre résumé, introduction, matériels et méthodes, discussions, résultats, références.
- d. titre, Introduction, matériels et méthodes, résultats, discussion, références, résumé.
- e. titre, références, résumé, Introduction, matériels et méthodes, résultats, discussions.

6. L'organisation du PLC RAA au niveau périphérique est assurée par: cochez là où les réponses justes

- a. USB-SEMEP-CHU-PHARMACIE-DSP
- b. CHU-USB-SEMEP-PHARMACIE-DSP
- c. SEMEP-PHARMACIE-CHU-USB-DSP
- d. USB-CHU-SEMEP-PHARMACIE-DSP
- e. La réponse (a) est juste.

7. Le calendrier national de vaccination dépend: cochez la ou les réponses fausses

- a. La situation épidémiologique
- b. la réponse immunitaire aux différents vaccins
- c. le respect de la chaîne du froid des vaccins
- d. adhésion de la population

8. Parmi les facteurs déclenchant des MTH on cite: Cochez la ou les réponses fausses

- a. Une urbanisation rapide et désordonnée dans le mode de vie urbain
- b. un contexte géographique favorable
- c. une situation de l'habitant très préoccupante avec l'absence de réseau d' AEP
- d. La conformité du réseau d'AEP favorisé par l'insuffisance des contrôles techniques des services de l'hydraulique à toutes les étapes et l'interconnexion (cross connexion) entre réseaux d'AEP et réseaux d'assainissement

9. Un nourrisson âgé de 9 mois se présenter à la PMI pour la vaccination, la sage-femme découvre que sa vaccination a été interrompue au troisième mois et à l'examen clinique on trouve une pharyngite. on a décidé de (cochez la ou les réponses justes)
- traiter le nourrisson puis continuer la vaccination
 - traiter le nourrisson et refaire toute la vaccination
 - ne pas traiter le nourrisson et refaire la vaccination
 - ne pas traiter le nourrisson et continuer la vaccination
10. Un enfant âgé de 7 ans hospitalisé pour une méningite à méningocoques le médecin traitant décide de (cochez la ou les réponses justes)
- Déclarer la maladie-traité l'enfant et donner une chimio prophylaxie à l'entourage.
 - déclarer la maladie-traité l'enfant instauré une chimio prophylaxie et une vaccination à l'entourage.
 - Déclarer la maladie-traité l'enfant fermer l'école par crainte de la propagation de l'épidémie.
 - traiter le malade- instauré une chimio prophylaxie et vaccination de l'entourage.
11. La rage:(cochez la ou les réponses sont fausses)
- La rage en Algérie est essentiellement une rage sylvatique
 - le réservoir de la rage sylvatique est essentiellement le chien et chat
 - le réservoir de la rage canine est essentiellement le chien et chat
 - il n'y a pas de rage domestique sans rage sylvatique
12. La rage est une maladie:(cochez la ou les réponses sont justes)
- Une fois déclarée est mortelle
 - A déclaration facultative
 - bénéficiant d'une vaccinothérapie
 - évitable par la vaccination
13. La fièvre jaune (cochez là où les réponses sont fausses)
- Maladie hémorragique virale chronique.
 - Maladie à transmission vectorielle.
 - Le traitement spécifique de la fièvre jaune est efficace.
 - Sa principale mesure de prévention est la vaccination.

14. Le centre de dépistage (CDV) : (cochez-la ou les réponses sont fausses)

- a. Assure un dépistage gratuit et facultatif
- b. joue un rôle important dans la prévention du VIH
- c. contribue à combattre la stigmatisation et la discrimination
- d. facilite le recours précoce et inadéquat des personnes séro+/- aux VIH aux services
- e. Aide les individus à modifier leurs comportements sexuels

15. La prévention primaire vise à: (cochez-la ou les réponses sont justes)

- a. Diminuer la prévalence d'une maladie dans une population
- b. Diminuer l'incidence des maladies dans une population
- c. Diminuer la prévalence des incapacités, récidives mentalité, consécutives à une maladie
- d. Réduire le risque d'apparition de cas nouveaux

16. L'objectif de l'approche «STEP Wise» est de : (cochez-la ou les réponses sont justes)

- a. Augmenter le niveau d'exposition aux facteurs de risques des maladies non transmissibles
- b. Dresser la carte des pandémie émergentes des maladies vectorielles
- c. surveiller les facteurs le risque des maladies non transmissibles
- d. améliorer les soins aux personnes souffrant de maladies transmissibles

17. parmi les études suivantes quelle(s) est/sont le(s) plus adaptée pour étudier la relation entre le polymorphisme génétique

- a. Étude cas-témoin
- b. étude transversal
- c. étude cohorte exposé /non exposé
- d. essai contrôlé randomisé
- e. étude descriptive

18. L'étude de la relation du cancer avec les hormones stéroïdiennes (CASH), la comparaison de l'utilisation antérieure de contraceptifs oraux chez un groupe des femmes qui présente le cancer du sein et un groupe de femmes saine (ne présentent pas le cancer du sein) est un exemple de quel type (s) d'étude?

- a. Essai clinique
- b. Etude cohorte
- c. Enquête de prévalence
- d. Etude cas-témoin
- e. Etude observationnelle

19. Dans l'étude de Framingham, un groupe de résidents était suivi depuis les années 1950 pour identifier l'apparition et les facteurs de risque de maladies cardiaques, et un exemple de quel type(s) d'étude ?

- a. Cohorte exposé/non exposé
- b. Cas témoin
- c. Expérimentale
- d. Observationnelle
- e. Essai clinique

20. La surveillance épidémiologique comprend diverses activités sauf:

- a. Collecte de données
- b. la diffusion des données
- c. contrôle de la maladie
- d. l'analyse des données
- e. l'interprétation des résultats