



EXAMEN FINAL DU MODULE DE GASTROENTEROLOGIE

Le 16 janvier 2014

- 1) Le papillome est une tumeur : (cochez la ou les réponses justes)
- a- Benigne
 - b- Maligne
 - c- Siège dans le colon
 - d- Siège dans l'œsophage
- 2) Les critères histo-pronostiques des tumeurs digestives sont : (cochez la ou les réponses justes)
- a- L'IRM
 - b- Le degré de la différenciation tumorale
 - c- Le stade TNM
 - d- Le type tumoral
- 3) La ponction biopsie hépatique : (cochez la ou les réponses justes)
- a- Ramène un échantillon de la lésion
 - b- Est indispensable pour poser le diagnostic de l'hépatite chronique
 - c- Est un examen cytologique
 - d- Peut être non concluante
- 4) La fibrose de l'hépatite chronique : (cochez la ou les réponses justes)
- a- Peut dessiner des ponts
 - b- Peut dessiner des tunnels
 - c- Peut dessiner des septas
 - d- Peut dessiner des routes
- 5) Le cancer de l'estomac est caractérisé par : (cocher la réponse juste)
- a) Cancer digestif peu fréquent
 - b) Le sexe féminin est le plus touché
 - c) L'helicobacter pylori n'est pas incriminé dans le cancer de l'estomac
 - d) Les lésions de gastrite, en particulier la métaplasie et la dysplasie constituent des précurseurs du cancer
 - e) Le pronostic du cancer de l'estomac s'est amélioré

6) Les signes cliniques pouvant être retrouvés dans le cancer de l'estomac sont : (cocher la réponse fausse) :

- a) Les épigastralgies
- b) Une anémie
- c) Une altération de l'état général
- d) Des hémorragies digestives de grande abondance souvent présentes
- e) Des phlébites migratrices

7) Dans le cancer du rectum : (cocher la réponse fausse)

- a) Le carcinome de type Leberkhunien est la forme habituelle
- b) Le carcinome à cellules en bague à chaton est une entité parfois retrouvée
- c) Le lymphome de Hodgkinien est un type histologique possible
- d) Les métastases ganglionnaires sont rares
- e) Les cancers multifocaux sont possibles : rectum et colon

8) Les examens complémentaires qui peuvent être pratiqués dans le cancer du rectum sont les suivants : (cocher la réponse fausse)

- a) Le lavement baryté est le premier examen à demander
- b) La rectoscopie avec biopsies multiples
- c) La coloscopie totale avec biopsies
- d) l'IRM abdominopelvienne -
- e) l'écho endoscopie

9) Le kyste hydatique est caractérisé par : (cocher la réponse fausse)

- a- La rupture du kyste dans la cavité péritonéale passe souvent inaperçue
- b- Les kystes multiples du foie peuvent poser un problème diagnostique
- c- Les kystes centraux se révèlent souvent par un ictère
- d- Les kystes de la face supérieure du foie peuvent avoir une traduction thoracique
- e- Les réactions immuno enzymatiques ont une sensibilité diagnostique de 100%/*

10) Le traitement du kyste hydatique du foie comporte : (cocher la réponse juste)

- a- Un traitement médical dans les kystes jeunes
- b- L'extraction de la membrane prolifère et traitement du parasite
- c- L'aspiration du liquide hydatique avec traitement du parasite
- d- Ponction du kyste et extraction de la membrane prolifère
- e- Aucune de ces propositions n'est juste

11) La manifestation clinique exacte d'une lithase vésiculaire simple est : (cochez la réponse juste)

- a- Douleurs de l'hypochondre droit déclenchées par les repas - Fièvre - Vomissements.
- b- Douleurs de l'hypochondre droit - Altération de l'état général - Nausées.
- c- Douleur de l'hypochondre droit à début brutal - Nausées et Vomissements - Etat général conservé.

16) La classification de Forrest nous renseigne sur : (cochez la réponse juste) †

- a- Le saignement lui-même
- b- L'origine du saignement.
- c- Le risque de récurrence.
- d- L'attitude thérapeutique à adopter (sclérose).
- e- N'est pas possible d'établir en cas de saignement important

17) Devant une ingestion caustique et parmi ces signes de gravité quel est celui qui doit être le plus pris en considération par le chirurgien ?

- a- La nature du produit caustique
- b- Ingestion massive supérieure à 150 cc.
- c- Troubles psychiques.
- d- L'acidose.
- e- Les signes de perforation digestive.

MAGIC - SERVICE
BOUBEKEUR

18) Devant un accident caustique l'examen clinique insistera sur : (cochez la ou les réponses justes)

- a- L'examen ORL.
- b- L'examen pleuro pulmonaire.
- c- L'examen de l'abdomen.
- d- L'examen psychiatrique.
- e- Toutes les réponses sont justes.

19) La dysphagie doit faire rechercher un cancer de l'œsophage : (cochez la réponse fausse) †

- a- Quand elle s'accompagne d'une perte de poids.
- b- Quand elle s'accompagne d'une dysphonie.
- c- Quand elle est paradoxale.
- d- Quand elle survient progressivement.
- e- Quand elle survient chez un homme de plus de 50 ans alcoolique et tabagique.

MAGIC - SERVICE
BOUBEKEUR

20) La fibroscopie nous apporte un renseignement important : (cochez la réponse fausse) †

- a- Sur l'aspect de la tumeur.
- b- Sur la distance de la tumeur par rapport aux arcades dentaires.
- c- Sur le type histologique de la tumeur.
- d- Sur la présence ou l'absence d'une muqueuse de Barrett.
- e- L'état de la paroi gastrique en vue d'une éventuelle gastroplastie.

juste

- d- Douleurs à début brutal - Nausées et Vomissements - Etat général altéré.
- e- Contracture de l'hypochondre droit - Fièvre - Vomissements.

12) Quelles sont les affections qui peuvent être considéré comme facteur étiopathogénique dans la survenue du cancer du colon? (cochez les réponses justes)

- a- Rectocolite ulcéro-hémorragique
- b- Maladie de Crohn
- c- Sigmoidite diverticulaire
- d- Polypose colique familiale
- e- Syndrôme de Lynch.

13) L'examen complémentaire le plus préformant pour le diagnostic du cancer des voies biliaires extra-hépatiques est : (cochez la réponse juste) :

- a- Dosage des phosphatases alcalines.
- b- Cholangiographie par cathétérisme rétrograde endoscopique (CPRE) avec biopsie ou prélèvement cytologique.
- c- Fibroscopie gastroduodénale
- d- Bill - IRM
- e- Tomodensitométrie hépatobiliaire seule.

14) La symptomatologie de la lithiase de la voie biliaire principale est faite de : (cochez la réponse juste)

- a- Douleur de l'épigastre - fièvre
- b- Vomissement - diarrhée - Ictère
- c- Douleur de l'hypochondre droit - Fièvre - Ictère -
- d- Arrêt des matières et des gaz - Fièvre - Ictère
- e- Douleur de l'épigastre - Fièvre - Ictère

15) Quelle réponse choisissez-vous pour décrire une hémorragie digestive haute? *la plus juste*

- a- elle s'agit d'un saignement qui peut provenir depuis l'œsophage jusqu'au duodénum.
- b- elle se manifeste volontiers par une hématomèse qui est le rejet de sang par la bouche.
- c- C'est un vomissement de sang rouge vif avec ou sans caillot et peut être associé à des signes de choc.
- d- L'étiologie ulcéreuse est la plus fréquente
- e- Elle présente des signes annonciateurs : pâleur, lipothymies, tachycardie.

21) Devant un ulcère gastroduodénal quelle complication peut menacer le pronostic vital :
(cochez la réponse juste)

- a- La perforation.
- b- La sténose.
- c- La cancérisation.
- d- L'hémorragie digestive.
- e- La réponse "a" est juste.

22) Quand vous examinez un patient qui présente une perforation d'ulcère un de ces éléments retient votre attention ; (cochez la réponse juste)

- a- La disparition de la matité pré hépatique.
- b- La contracture abdominale.
- c- La matité des flancs.
- d- La douleur au toucher rectal.
- e- La sensibilité abdominale en cas de perforation bouchée.

23) Parmi les diagnostics différentiels de la péritonite par perforation d'ulcère chez un adulte jeune de sexe masculin quel est le moins probable :

- a- La péritonite appendiculaire.
- b- La péritonite biliaire.
- c- La pancréatite aigue.
- d- La perforation colique.
- e- La crise ulcéreuse hyperalgique.

24) Lors d'une sténose ulcéreuse les vomissements (cochez la réponse fausse)

- a- sont alimentaires.
- b- Post prandiaux tardifs.
- c- ils conduisent à un état de déshydratation.
- d- S'accompagnent d' un ganglion de Troisier.
- e- On retrouve la notion d'antécédents d'épigastralgies.

25) La thrombose hémorroïdaire : (cochez la réponse fausse)

- a- Est une complication des hémorroïdes.
- b- La douleur est insupportable.
- c- Elle résulte de la formation d'un caillot dans le plexus hémorroïdaire.
- d- Impose une intervention chirurgicale urgente.
- e- Se présente sous la forme d'une tuméfaction bleuâtre.

26) La fissure anale se complique : (cochez la réponse fausse)

- a- D'infection.
- b- De diarrhées.
- c- D'hémorragie.
- d- De douleur.
- e- De pérennisation dans le temps donnant une fissure ancienne.

27) La fistule anale est définie par : (cochez la réponse juste)

- a- Une infection des glandes d'Hermann et Desfosses.
- b- Un trajet fistuleux.
- c- Un orifice primaire.
- d- Un orifice secondaire.
- e- Parfois une évolution naturelle de quelques abcès péri anaux.

28) Chez un cirrhotique connu, tous ces examens permettent la recherche de signes d'hypertension portale, sauf un lequel ?

- a- Fibroscopie oeso-gastroduodénale
- b- Ponction biopsie du foie
- c- Echographie abdominale
- d- Mesure de la pression sus-hépatique bloquée
- e- Echodoppler vasculaire

29) Concernant l'hépatite virale aigue B, une de ces propositions est fausse laquelle ?

- a- Peut se transmettre par voie sanguine
- b- Peut être asymptomatique
- c- Ne passe jamais à la chronicité.
- d- Peut donner un tableau d'hépatite aigue grave
- e- La transmission mère enfant est possible

30) Concernant la cirrhose hépatique d'origine virale C quelle est la proposition juste ?

- a- Est toujours symptomatique décompensée
- b- S'accompagne toujours d'un ictère.
- c- Prédipose à la survenue d'un carcinome hépatocellulaire
- d- Est toujours mortelle en moins de 5 ans
- f- Guérit après un traitement par les antiviraux prescrit pendant une année

31) Ces manifestations se rencontrent au cours l'hémochromatose génétique, sauf un, lequel ?

- a- Diabète
- b- Cardiomyopathie
- c- Mélanodermie
- d- Arthropathies
- e- Anneau de Kayser-Fleisher

- 32) Devant une ascite quel est parmi ces signes celui qui oriente vers une cirrhose du foie :
- a- Douleur de l'hypochondre droit
 - b- Souffle hépatique
 - c- Un liquide d'ascite riche en protide
 - d- Un Astérix
 - e- Une hépatomégalie douloureuse

33) Une ascite est dite exsudative si :

- a- Le taux d'albumine dans le liquide d'ascite est supérieur à 30g/l
- b- Le taux d'albumine dans le liquide d'ascite est inférieur à 30g/l
- c- Présence de germes à l'examen bactériologique du liquide d'ascite
- d- Le taux d'amylase dans le liquide d'ascite est élevé
- e- Présence d'un taux de leucocytes supérieurs à 1000/mm³ dans le liquide d'ascite

34) Concernant l'ascite cloisonnée, quelle est la proposition fautive ?

- a- C'est une ascite exsudative
- b- Donne une matité en damier
- c- Le signe du Flot est positif
- d- L'échographie abdominale permet le diagnostic positif
- e- Peut être secondaire à une tuberculose péritonéale

35) Quel est la complication possible de l'amibiase intestinale parmi ces affections ?

- a- Dégénérescence au niveau du colon
- b- Occlusion intestinale haute
- c- Abscès hépatique
- d- Atrophie villositaire
- e- Fistule anale

36) Selon la classification ROME III, les troubles fonctionnels intestinaux comprennent : (quelle est la réponse fautive ?)

- a- Syndrome de l'intestin irritable
- b- Ballonnement fonctionnel
- c- Dyspepsie fonctionnelle
- d- Constipation fonctionnelle
- e- Diarrhée fonctionnelle

37) Dans le syndrome de l'intestin irritable, vous demandez les examens para cliniques si

(La réponse fautive) ?

- a- Antécédents familiaux de cancer colique
- b- Masse abdominale à l'examen
- c- A tous les âges
- d- Aggravation récente d'une symptomatologie ancienne
- e- Présence d'un amaigrissement

38) le diagnostic biologique d'une parasitose intestinale se fait par : (la réponse juste)

- a- hyper éosinophilie
- b- hyperleucocytose
- c- syndrome de choléstase
- d- Syndrome de cytolysse

39) la sérologie virale de l'hépatite virale A doit être recherchée par : (la réponse juste)

- a- Ag HBs
- b- Ac anti HIV
- c- Ac anti HCV
- d- AC anti HAV

40) Tous ces signes sont retrouvés dans la pancréatite chronique sauf un:

- a- Un ictère
- b- Un épanchement pleural
- c- Une stéatorrhée
- d- Une douleur épigastrique
- e- Une splénomégalie

41) Les faux kystes du pancréas : (la réponse fausse)

- a- Peuvent fistuliser dans les organes creux de voisinage
- b- Donnent des hémorragies digestives
- c- Sont traités définitivement par ponction
- d- Peuvent s'infecter

42) On évoque une maladie de Crohn chez un malade ayant une diarrhée chronique avec : (La réponse fausse)

- a- Ulcérations coliques sans intervalles de muqueuse saine
- b- Une atteinte iléale
- c- Présence d'un abcès cryptique à la biopsie
- d- Présence de granulome tuberculoïde sur les biopsies

43) Dans la maladie de Crohn il y a des manifestations extra intestinales qui sont les suivantes sauf : (la réponse fausse)

- a- Un erythème noueux
- b- Une cholangite sclérosante
- c- Une splénomégalie
- d- Un pyoderma gangrénosum

44) La maladie de Crohn : (la réponse fausse)

- a- Une maladie chronique du tube digestif entier
- b- Il existe une prédisposition familiale
- c- Il y a une atteinte transmurale
- d- Il n'y a pas d'atteintes périnéales

45) Dans la maladie de Biermer il existe dans le sérum : (la réponse juste)

- a- Un anticorps anti muscle lisse
- b- Un anticorps Anti cellules pariétales
- c- Un anticorps Anti mitochondries
- d- Un anticorps Antinucléaire

46) Dans la maladie de Biermer : (la réponse fausse)

- a- C'est une gastrite atrophiante
- b- Associée à des maladies auto immunes
- c- L'Atteinte de l'antra est exclusive
- d- Le traitement à la vitamine B 12 est à vie

47) Le carcinome hépato cellulaire est recherché systématiquement devant : (la réponse fausse)

- a- Une embolie pulmonaire
- b- Une hypoglycémie
- c- Une fièvre chez le cirrhotique
- d- Une polyglobulie
- e- Une diminution des alphas foeto-protéines inférieur à 500 ng/ml

48) La contamination de la tuberculose intestinale se fait par : (la réponse fausse)

- a- Dissémination hématogène
- b- Foyer génital de voisinage infecté
- c- Ingestion de BK ~~directes~~ à partir d'aliments souillés
- d- Lymphatique

49) Le traitement de la tuberculose impose d'ajouter l'ethambutol pour : (la réponse fausse)

- a- Une tuberculose rénale
- b- Une tuberculose méningée
- c- Une tuberculose osseuse
- d- Une tuberculose ganglionnaire
- e- Une tuberculose péricardique

50) Dans la diarrhée par malabsorption par atteinte du grêle proximal : (la réponse fausse)

- a- Le test au D xylose est positif
- b- Il existe une carence en vitamine D
- c- Il existe une carence en folates
- d- Il existe une carence en vitamine K



M 429 Gastro - entérologie, programme d'examen de : "Examen", de la : Quatrième année de Médecine

Date de l'épreuve : 16/01/2014

Page 1/1

Corrigé Type

Barème uniforme : 0,4 point(s) par question

N°	Rép./Variantes 1&2
1	AD
2	BCD
3	ABD
4	AC
5	D
6	D
7	D
8	A
9	A
10	E
11	C
12	ABDE
13	B
14	C
15	C
16	C
17	E
18	ABCDE E
19	C
20	C
21	D
22	B
23	C
24	D
25	D
26	B
27	A
28	B
29	C
30	C
31	E
32	D
33	A
34	C
35	C
36	C

N°	Rép./Variantes 1&2
37	C
38	A
39	D
40	E
41	C
42	A
43	C
44	D
45	B
46	C
47	E
48	D
49	D
50	C

MAGIC - SERVICE
BOMBEXEUR

Cladwell
MSB