



Corrigé type
0

EXAMEN DE RATTRAPAGE DU MODULE DE GASTROENTEROLOGIE

Le 01 septembre 2014

- 1) Parmi les complications chirurgicales de l'ulcère GD, quelle est la moins fréquente?
- a) Hémorragie digestive
 - b) Cancer gastrique
 - c) La perforation
 - d) Sténose pylorique
 - e) La réponse (a) est juste
- MAGIC - SERVICE
BOURBOURG
- 2) Quelles sont les indications chirurgicales durant un accident caustique :
- a) Ingestion de 50 cc de produit caustique
 - b) Péritonite
 - c) Hémorragie digestive
 - d) Sténose œsophagienne non dilatable
 - e) Sténose pylorique
- MAGIC - SERVICE
BOURBOURG
- 3) En matière de traitement des sténoses caustiques de l'œsophage, le remplacement fait appel à : (la ou les réponses justes)
- a) L'estomac
 - b) Le colon transverse
 - c) Le colon droit
 - d) L'intestin grêle
 - e) Le colon gauche
- MAGIC - SERVICE
BOURBOURG
- 4) Quel(s) est (sont) le (les) type(s) histologique(s) le (les) plus fréquent(s) des cancers de l'œsophage (la ou les réponses justes)
- a) Lymphome
 - b) Adénocarcinome
 - c) Sarcome
 - d) Carcinome épidermoïde
 - e) Tumeur stomale

5) Le bilan d'extension du cancer de l'œsophage comporte tous ces éléments sauf un lequel ?

- a) Echoendoscope
- b) Echographie abdominale
- c) Transit œsogastroduodéal (TOGD)
- x d) Scanner abdominal
- e) Scanner thoracique

6) La dysphagie indique (la ou les réponses justes)

- x a) Un cancer de l'œsophage
- b) Un diverticule de l'œsophage (Zenker)
- c) Un mégaeosophage
- d) Une sténose peptique
- x e) Une sténose caustique

7) L'hémorragie digestive est grave quand (la ou les réponses justes)

- x a) Le malade décrit un reflux important de sang
- x b) Présence d'un état de choc
- c) Association hématemèse, rectorragies
- d) La malade présente une hypotension orthostatique
- e) Le malade a des antécédents d'ulcère.

8) Le pronostic d'une hémorragie digestive dépend surtout de (la ou les réponses justes)

- x a) Des gestes de réanimation
- b) Une fibroscopie
- x c) Une artériographie
- x d) Un examen TDM
- x e) Une intervention chirurgicale

9) La meilleure voie d'abord pour le traitement chirurgical d'un cancer de l'œsophage du tiers inférieur est :

- a) Abdominale
- b) Abdomino-thoracique droite
- x c) Thoracique gauche
- d) Coelioscopique
- e) Abdominale, thoracique et cervicale

10) Une hémorragie digestive peut se compliquer de : (la ou les réponses justes)

- a) Un état de choc
- b) Encéphalopathie
- c) CIVD
- d) Péritonite
- e) Insuffisance rénale.

11) Cocher la ou les réponses justes :

- a) Le ver adulte du ténia échinococcus peut vivre dans l'intestin du mouton
- b) L'hôte intermédiaire peut être essentiellement l'enfant
- c) L'embryon gagne le foie à travers le cycle entéro-portal
- d) L'adventice constitue la membrane germinative du kyste
- e) Les fistules kysto-biliaires sont des complications fréquentes

12) Cocher la ou les réponses justes :

- a) La rupture du kyste hydatique dans la cavité péritonéale est une complication grave
- b) L'hyperéosinophilie est un examen biologique non spécifique du kyste hydatique
- c) les kystes hydatiques de siège central ont une symptomatologie thoracique
- d) Le type 3 échographique est un aspect cloisonné
- e) Le kyste hydatique jeune uni vésiculaire est de traitement médical

13) Cocher la ou les réponses justes :

- a) L'évolution du kyste du foie est rapide
- b) Des poussées d'urticaire sont parfois retrouvées chez un patient porteur de kyste du foie
- c) L'hémagglutination passive est peu spécifique dans le diagnostic du kyste hydatique du foie
- d) Les tests immuno-enzymatiques ont une sensibilité diagnostic du kyste hydatique de 100%
- e) L'échographie abdominale est un examen incontournable dans le diagnostic du kyste hydatique du foie

MAGIC - SERVICE
BOUBEKEUR

14) Cocher la réponse fausse :

- a) Le type 5 échographique de Gherbi dans le kyste hydatique du foie est une lésion solide calcifiée
- b) Le type 2 échographique de Gherbi est image liquidienne à paroi dédoublée (décollement des membranes partiel ou total)
- c) L'ASP peut mettre en évidence des calcifications de la paroi du kyste
- d) Le type 1 échographique de Gherbi est pathognomonique du kyste hydatique du foie
- e) La deuxième localisation du kyste hydatide après le foie reste le poulmon

BOUBEKEUR

15) Cocher la ou les réponses justes :

- a) Le sexe féminin est le plus touché dans le cancer du rectum
- b) La polypose recto colique familiale dégénère dans 100% des cas
- c) 95% cancers du rectum sont de type colloïde muqueux
- d) L'extension métastatique dans le cancer du rectum se fait essentiellement par voie veineuse et lymphatique
- e) Le stade T2 de la classification TNM dans le cancer du rectum correspond à l'envahissement de la musculuse

- 16) Cocher la réponse fautive :
- a) Le cancer du rectum peut se révéler par des troubles du transit
 - b) Un syndrome hémorroïdaire ou fissuraire peut révéler un cancer du rectum
 - c) L'examen de l'abdomen est l'examen clef dans le diagnostic du cancer du rectum
 - d) Le toucher rectal peut être normal dans le cancer du rectum
 - e) L'IRM pelvienne est un examen morphologique essentiel dans le bilan d'extension du cancer rectal

- 17) Cocher la ou les réponses justes :
- a) L'amputation du rectum est le seul traitement chirurgical efficace dans le cancer du rectum
 - b) La résection rectale emportant le méso rectum constitue la base du traitement chirurgical du cancer du rectum
 - c) La chirurgie des métastases en particulier hépatiques est possible dans le traitement du cancer du rectum
 - d) la chimiothérapie reste inefficace dans le traitement du cancer du rectum
 - e) La radio chimiothérapie néo adjuvante est indiquée surtout pour les tumeurs T4 de la classification TNM

- 18) Cocher la ou les réponses justes Le cancer de l'estomac peut être révélé par :

- a) Douleurs épigastriques
- b) Vomissements alimentaires
- c) Hématémèses
- d) Une altération de l'état général
- e) Une colique hépatique

- 19) Cocher la ou les réponses justes Dans le cancer de l'estomac :

- a) L'examen physique de l'abdomen est toujours normal
- b) La dysphagie traduit un envahissement de l'antrum gastrique
- c) L'hélicobactère pylori peut être à l'origine du cancer de l'estomac
- d) L'ulcère gastrique ne dégénère jamais
- e) Le stade T3 correspond au cancer ayant franchi la séreuse gastrique

- 20) Cocher la ou les réponses fautes Dans le cancer de l'estomac :

- a) La tumeur de Krukenberg correspond à une métastase splénique
- b) L'écho-endoscopie permet d'apprécier le degré l'infiltration néoplasique de la paroi gastrique
- c) La gastrectomie totale avec curage ganglionnaire est le traitement idéal du cancer de l'estomac
- d) Les gastrectomies palliatives sont indiquées pour les tumeurs avancées et compliquées
- e) La chimiothérapie n'a aucune place dans le traitement du cancer du rectum

21) Le papill

- a)
- b)
- c)
- d)

22) Les cr

- a)
- b)
- c)
- d)

23) La d

- a)
- b)
- c)
- d)

24) La

- a)
- b)
- c)
- d)

25) La

- a)
- b)
- c)
- d)

26) L

- a)
- b)
- c)
- d)

27)

- a)
- b)
- c)
- d)

28

21) Le papillome est une tumeur : (la ou les réponses justes)

- a) Benigne
- b) Maligne
- c) Siège dans le colon
- d) Siège dans l'œsophage

22) Les critères histo-pronostiques des tumeurs digestives sont :

- a) L'IRM
- b) Le degré de la différenciation tumorale
- c) Le stade TNM
- d) Le type tumoral.

23) La dysplasie dans le tube digestif peut être (la ou les réponses justes)

- a) De haut grade
- b) Une lésion précancéreuse
- c) Franchir la lame basale
- d) Un cancer in situ

24) La classification de METAVIR : (la ou les réponses justes)

- a) Intéresse les lésions hépatiques,
- b) Grade la fibrose de F0 à F4 .
- c) Grade l'activité par la nécrose portale et la nécrose lobulaire.
- d) Grade la cirrhose en F3

25) La ponction biopsie hépatique : (la ou les réponses justes)

- a) Ramène un échantillon de la lésion.
- b) Est indispensable pour poser le diagnostic de l'hépatite chronique.
- c) Est un examen cytologique.
- d) Peut être non concluante.

26) La fibrose de l'hépatite chronique : (la ou les réponses justes)

- a) Peut dessiner des ponts.
- b) Peut dessiner des tunnels.
- c) Peut dessiner des septas.
- d) Peut dessiner des routes.

27) Parmi les maladies suivantes lesquelles sont à l'origine d'une ascite : (la ou les réponses justes)

- a) Une cirrhose hépatique
- b) Une tumeur de l'ovaire
- c) Une tuberculose péritonéale
- d) Un syndrome de Budd Chiari
- e) Une rectocolite hémorragique

28) L'appréciation de l'efficacité du traitement diurétique type aldactone se fait par : (la ou les réponses justes)

- a) La courbe de poids
- b) La courbe de diurèse
- c) L'ionogramme urinaire

- d- L'ionogramme sanguin
- e- Le périmètre abdominal

29) Comment on apprécie la tolérance d'un traitement diurétique : (la ou les réponses justes)

- a- Un ionogramme sanguin
- b- Un ionogramme urinaire
- c- Une créatininémie
- d- Une créatininurie des 24 heures
- e- Une protidémie

30) Dans le syndrome de malabsorption : (la ou les réponses justes)

- a- L'anémie est macrocytaire
- b- L'anémie est microcytaire
- c- Le facteur B₁₂ est élevé
- d- L'albumine est diminuée
- e- La tuberculose peut être une cause

31) Dans la diarrhée par malabsorption l'atteinte du grêle proximal : (la ou les réponses justes)

- a- Le test au D xylose est positif
- b- Le test de schilling est positif
- c- Il existe une carence en vitamine D
- d- Il existe une carence en folates
- e- Il existe une carence en vitamine k

32) Parmi les signes cliniques et biologiques suivants quels sont ceux en faveur de malabsorption :

(La ou les réponses justes)

- a- Un amaigrissement important
- b- une diarrhée glaireuse
- c- une stéatorrhée
- d- Une diarrhée sanglante
- e- L'horaire est matinal

33) Lors d'une hémorragie digestive quels sont les contre indications à la fibroscopie : (la ou les réponses justes)

- a- Une thrombopénie à 60 000 plaquettes/mm³
- b- Un infarctus du myocarde récent
- c- Un pneumopéritoine
- d- Une notion d'ingestion caustique de moins de 12 heures
- e- Une hémorragie digestive bien compensée

34) Parmi les affections suivantes quelles sont les causes de rectorragies :
(la ou les réponses justes)

- a- Abscès péri anal ✓
- b- Une fistule anale ✓
- c- Prolapsus hémorroïdaire ✓
- d- Proctalgie fugace
- e- Une fissure anale ✓

35) Les deux étiologies les plus importantes de l'hémorragie digestive sont : (la ou les réponses justes)

- a- Mallory weiss
- b- Rupture de varices œsophagiennes ✓
- c- Œsophagites
- d- Ulcères gastro duodénaux ✓
- e- L'endométriose

MAGIC - SERVICE
BOUBEKEUR

36) Quels examens réalisez-vous en premier devant une suspicion hépatite virale chronique :
(la ou les réponses justes)

- a- Un antigène HBS ✓
- b- Un dosage IGA ✓
- c- Un anticorps anti HVC ✓
- d- Un HIV ✓
- e- Un BW ✓

B C D

37) Quels examens réalisez-vous quand l'antigène HBS est positif :
(la ou les réponses justes)

- a- Anti corps anti HBS ✓
- b- Anti corps anti HBe ✓
- c- Anti corps anti HBc ✓
- d- Antigène HBe ✓
- e- L'ADN du VHB ✓

MAGIC - SERVICE
BOUBEKEUR

38) Quel est le profil sérologique de l'hépatite virale chronique B : (la ou les réponses justes)

- a- Un antigène HBS positif ✓
- b- Anti corps anti HVC positif
- c- Un anti corps IgM HBc positif ✓
- d- Anti corps anti HBs négatif ✓
- e- Anti corps IgG anti HBc positif ✓

39) Un ictère à bilirubine conjugué est évoqué devant : (la ou les réponses justes)

- a- Des selles normo-colorées ✓
- b- Des urines foncées ✓
- c- Des urines claires ✓
- d- Des selles décolorées ✓
- e- Un dépôt de sels biliaires responsables de grattage ✓

40) Dans l'ictère par cholestase intra hépatique lesquelles ne figure pas parmi les étiologies : (la ou les réponses justes)

- a- kyste du pancréas
- b- Hépatite alcoolique
- c- Lithiase de la voie biliaire principale
- d- Hépatite auto-immune
- e- Maladie de Wilson

41) Parmi les affections suivantes quelles sont celles qui donnent un ictère à bilirubine conjuguée : (la ou les réponses justes)

- a- Lithiase du cholédoque
- b- Maladie de Gilbert
- c- Hépatite virale
- d- Lithiase vésiculaire non compliquée
- e- Hépatite médicamenteuse

42) Les signes échographiques d'un syndrome d'hypertension portale sont : (la ou les réponses justes)

- a- Une veine splénique supérieure à 8 mm
- b- Un tronc porte supérieur à 14 mm
- c- Une circulation de suppléance
- d- Une ascite
- e- Une adénopathie

43) Dans la cirrhose le foie peut être : (la ou les réponses justes)

- a- Hépatomégalie
- b- Atrophie hépatique
- c- macronodulaire
- d- Dymorphisme hépatique
- e- Micronodulaire

44) Dans l'infection du liquide d'ascite on retrouve : (la ou les réponses justes)

- a- Plus de 250 polynucléaires /ml dans le liquide d'ascite
- b- Les germes peuvent être mis en évidence par culture
- c- Peut être révélée par une douleur abdominale
- d- La diarrhée est un signe souvent retrouvé
- e- la température est perturbée soit une fièvre soit une hypothermie

45) Les caractéristiques générales de la maladie de Crohn sont : (la ou les réponses justes)

- a- Des atteintes séparées par des intervalles de muqueuse saine
- b- Des atteintes continues
- c- Des atteintes segmentaires
- d- Des atteintes asymétriques
- e- Des atteintes symétriques

46) Les localisations préférentielles de la maladie de Crohn sont : (la ou les réponses justes)

- a- Iléales
- b- Gastriques
- c- Œsophagiennes
- d- Anales
- e- Iléo coliques

47) La maladie de Crohn est : (la ou les réponses justes)

- a- Plus fréquente chez l'homme
- b- Plus fréquente chez la femme
- c- Est diagnostiquée par des ASCA positifs
- d- Evolue par poussées rémissions
- e- Peut donner des suppurations

48) Les anti TNF alpha : (la ou les réponses justes)

- a- Sont contre indiqués s'il y a une infection grave
- b- Peuvent engendrer une tuberculose
- c- Sont donnés à la dose de 1mg/kg/j
- d- sont indiqués s'il ya non réponse aux 5ASA
- e- se prennent en per os

49) La RCH est une maladie qui se caractérise par : (la ou les réponses justes)

- a- Des poussées rémissions
- b- Une atteinte transmurale
- c- Une atteinte de l'iléon
- d- une atteinte de la bouche jusqu'à l'anus
- e- Une atteinte rectale quasi constante

50) Les complications de la RCH sont : (la ou les réponses justes)

- a- La dégénérescence
- b- Des fistules
- c- Une thrombophlébite
- d- Colectasie
- e- Des fractures osseuses