



## EXAMEN FINAL DU MODULE DE GASTROENTEROLOGIE

18/06 novembre 2014

Corrigé type

- 1) Le cancer de l'estomac est caractérisé par : (cocher la réponse juste)
- a) Cancer digestif peu fréquent
  - b) Le sexe féminin est le plus touché
  - c) L'helicobacter pylori n'est pas incriminé dans le cancer de l'estomac
  - d) Les lésions de gastrite, en particulier la métaplasie et la dysplasie constituent des précurseurs du cancer
  - e) Le pronostic du cancer de l'estomac s'est amélioré
- 2) Les signes cliniques pouvant être retrouvés dans le cancer de l'estomac sont : (cocher la réponse fausse) :
- a) Les épigastralgies
  - b) Une anémie
  - c) Une altération de l'état général
  - d) Des hémorragies digestives de grande abondance souvent présentes
  - e) Des phlébites migratrices
- 3) Dans le cancer du rectum : (cocher la réponse fausse)
- a) Le carcinome de type Lieberkhunien est la forme habituelle
  - b) Le carcinome à cellules en bague à chaton est une entité parfois retrouvée
  - c) Le lymphome non hodgkinien est un type histologique possible
  - d) Les métastases ganglionnaires sont rares
  - e) Les cancers multifocaux sont possibles : rectum et colon
- 4) Les examens complémentaires qui peuvent être pratiqués dans le cancer du rectum sont les suivants : (cocher la réponse fausse)
- a) Le lavement baryté est le premier examen à demander
  - b) La rectoscopie avec biopsies multiples
  - c) La coloscopie totale avec biopsies
  - d) l'IRM abdominopelvienne
  - e) l'écho endoscopie

5) Le kyste hydatique est caractérisé par : (cocher la réponse fausse)

- a- La rupture du kyste dans la cavité péritonéale passe souvent inaperçue
- b- Les kystes multiples du foie peuvent poser un problème diagnostique
- c- Les kystes centraux se révèlent souvent par un ictère
- d- Les kystes de la face supérieure du foie peuvent avoir une traduction thoracique
- e- Les réactions immuno enzymatiques ont une sensibilité diagnostique de 100%

6) Le traitement du kyste hydatique du foie comporte : (cocher la réponse juste)

- a- Un traitement médical dans les kystes jeunes
- b- L'extraction de la membrane proligère et traitement du parasite
- c- L'aspiration du liquide hydatique avec traitement du parasite
- d- Ponction du kyste et extraction de la membrane proligère
- e- Aucune de ces propositions n'est juste

7) La manifestation clinique exacte d'une lithiase vésiculaire simple est : (cochez la réponse juste)

- a- Douleurs de l'hypochondre droit déclenchées par les repas - Fièvre - Vomissements.
- b- Douleurs de l'hypochondre droit - Altération de l'état général - Nausées.
- c- Douleur de l'hypochondre droit à début brutal - Nausées et Vomissements - Etat général conservé.
- d- Douleurs à début brutal - Nausées et Vomissements - Etat général altéré.
- e- Contracture de l'hypochondre droit - Fièvre - Vomissements.

8) Quelles sont les affections qui peuvent être considérées comme facteur étiopathogénique dans la survenue du cancer du colon : (cochez les réponses justes)

- a- Rectocolite ulcéro hémorragique
- b- Maladie de Crohn
- c- Sigméïdite diverticulaire
- d- Polyposé colique familiale
- e- Syndrome de Lynch.

9) L'examen complémentaire le plus préformant pour le diagnostic du cancer des voies biliaires extra-hépatiques est : (cochez la réponse juste) :

- a- Dosage des phosphatases alcalines.
- b- Cholangiographie par cathétérisme rétrograde endoscopique (CPRE) avec biopsie ou prélèvement cytologique.
- c- Fibroscopie gastroduodénale
- d- Bili - IRM
- e- Tomodensitométrie hépatobiliaire seule.

10) La symptomatologie de la lithiase de la voie biliaire principale est faite de : (cochez la réponse juste)

- a- Douleur de l'épigastre - fièvre
- b- Vomissement - diarrhée - ictère
- c- Douleur de l'hypochondre droit - Fièvre - Ictère
- d- Arrêt des matières et des gaz - Fièvre - Ictère
- e- Douleur de l'épigastre - Fièvre - Ictère

11) Quelle réponse choisissez-vous pour décrire une hémorragie digestive haute ?

- a- elle s'agit d'un saignement qui peut provenir depuis l'œsophage jusqu'au duodénum.
- b- elle se manifeste volontiers par une hématomèse qui est le rejet de sang par la bouche.
- c- C'est un vomissement de sang rouge vif avec ou sans caillot et peut être associé à des signes de choc.
- d- L'étiologie ulcéreuse est la plus fréquente *MAGIC*
- e- Elle présente des signes annonciateurs : pâleur, lipothymies, tachycardie. *BOUBEREN*

12) La classification de Forrest nous renseigne sur : (cochez la réponse juste)

- a- Le saignement lui-même
- b- L'origine du saignement.
- c- Le risque de récurrence.
- d- L'attitude thérapeutique à adopter (sclérose).
- e- N'est pas possible à établir en cas de saignement important

13) Devant une ingestion caustique et parmi ces signes de gravité quel est celui qui doit être le plus pris en considération par le chirurgien ? *MAGIC*

- a- La nature du produit caustique *BOUBEREN*
- b- Ingestion massive supérieure à 150 cc.
- c- Troubles psychiques.
- d- L'acidose.
- e- Les signes de perforation digestive.

14) Devant un accident caustique l'examen clinique insistera sur : (cochez la ou les réponses justes)

- a- L'examen ORL.
- b- L'examen pleuro pulmonaire.
- c- L'examen de l'abdomen.
- d- L'examen psychiatrique.

e) Tous les réponses sont justes.

15) La dysphagie doit faire rechercher un cancer de l'œsophage : (cochez la réponse fausse)

- a- Quand elle s'accompagne d'une perte de poids.
- b- Quand elle s'accompagne d'une dysphonie.
- c- Quand elle est paradoxale.
- d- Quand elle survient progressivement.
- e- Quand elle survient chez un homme de plus de 50 ans alcoolique et tabagique.

16) La fibroscopie nous apporte un renseignement important : (cochez la réponse fausse)

- a- Sur l'aspect de la tumeur.
- b- Sur la distance de la tumeur par rapport aux arcades dentaires.
- c- Sur le type histologique de la tumeur.
- d- Sur la présence ou l'absence d'une muqueuse de Barrett.
- e- L'état de la paroi gastrique en vue d'une éventuelle gastroplastie.

17) Devant un ulcère gastroduodéal quelle complication peut menacer le pronostic vital.

(cochez la réponse juste)

- a- La perforation.
- b- La sténose.
- c- La cancérisation.
- d- L'hémorragie digestive.
- e- La réponse "a" est juste.

18) Quand vous examinez un patient qui présente une perforation d'ulcère un de ces éléments retient votre attention : (cochez la réponse juste)

- a- La disparition de la matité pré hépatique.
- b- La contracture abdominale.
- c- la matité des flancs.
- d- La douleur au toucher rectal.
- e- La sensibilité abdominale en cas de perforation bouchée.

19) Parmi les diagnostics différentiels de la péritonite par perforation d'ulcère chez un adulte jeune de sexe masculin quel est le moins probable :

- a- La péritonite appendiculaire.
- b- La péritonite biliaire.
- c- La pancréatite aiguë.
- d- La perforation colique.
- e- La crise ulcéreuse hyperalgique.

20) La fissure anale se complique : (cochez la réponse fausse)

- a- D'infection.
- b- De diarrhées.
- c- D'hémorragie.
- d- De douleur.
- e- De pérennisation dans le temps donnant une fissure ancienne.

21) La fistule anale est définie par : (cochez la réponse juste)

- a- Une infection des glandes <sup>MAGIE</sup> de Hermann et Desfosses.
- b- Un trajet fistuleux. <sup>BOUSSEUR</sup>
- c- Un orifice primaire.
- d- Un orifice secondaire.
- e- Parfois une évolution naturelle de quelques abcès péri anaux.

22) Chez un cirrhotique connu, tous ces examens permettent la recherche de signes d'hypertension portale, sauf un lequel ?

- a- Fibroscopie oeso-gastro-duodénale
- b- Ponction biopsie du foie
- c- Echographie abdominale
- d- Mesure de la pression sus-hépatique bloquée
- e- Echodoppler vasculaire

23) Concernant l'hépatite virale aiguë B, une de ces propositions est fausse laquelle ?

- a- Peut se transmettre par voie sanguine
- b- Peut être asymptomatique
- c- Ne passe jamais à la chronicité
- d- Peut donner un tableau d'hépatite aiguë grave
- e- La transmission mère enfant est possible

24) Concernant la cirrhose hépatique d'origine virale C, quelle est la proposition juste ?

- a- Est toujours symptomatique décompensée <sup>MAGIE - SERVA</sup>
- b - S'accompagne toujours d'un ictère. <sup>BOUSSEUR</sup>
- c- Prédispose à la survenue d'un carcinome hépatocellulaire
- d- Est toujours mortelle en moins de 5 ans
- f- Guérit après un traitement par les antiviraux prescrit pendant une année

25) Concernant l'ascite cloisonnée, quelle est la proposition fausse ?

- a. C'est une ascite exsudative
- b. Donne une matité en damier
- c. Le signe du Flot est positif
- d. L'échographie abdominale permet le diagnostic positif
- e. Peut être secondaire à une tuberculose péritonéale

26) Quel est la complication possible de l'amibiase intestinale parmi ces affections ?

- a- Dégénérescence au niveau du colon
- b- Occlusion intestinale haute
- c- Abscès hépatique
- d- Atrophie villositaire
- e- Fistule anale

27) le diagnostic biologique d'une parasitose intestinale se fait par : (la réponse juste)

- a- hyper éosinophilie
- b- hyperleucocytose
- c- syndrome de choléstase
- d- Syndrome de cytolyse

28) Les faux kystes du pancréas : (la réponse fausse)

- a- Peuvent fistuliser dans les organes creux de voisinage
- b- Donnent des hémorragies digestives
- c- Sont traités définitivement par ponction
- d- Peuvent s'infecter

29) On évoque une maladie de Crohn chez un malade ayant une diarrhée chronique avec :  
(La réponse fausse)

- a- Ulcérations coliques sans intervalles de muqueuse saine
- b- Une atteinte iléale
- c- Présence d'un abcès cryptique à la biopsie
- d- Présence de granulome tuberculoïde sur les biopsies

30) Dans la maladie de Crohn il y a des manifestations extra intestinales qui sont les suivantes  
sauf : (la réponse fausse)

- a- Un erythème noueux
- b- Une cholangite sclérosante
- c- Une splénomégalle
- d- Un pyoderma gangrénosum

31) La maladie de Crohn : (la réponse fausse)

- a- Une maladie chronique du tube digestif entier
- b- Il existe une prédisposition familiale
- c- Il y a une atteinte transmurale
- d- Il n'y a pas d'atteintes périnéales

32) Dans la maladie de Biermer il existe dans le sérum : (la réponse juste)

- a- Un anticorps anti muscle lisse
- b- Un anticorps Anti cellules pariétales
- c- Un anticorps Anti mitochondries

d- Un anticorps Antinucléaire

33) Dans la maladie de Biermer : (la réponse fausse)

- a- C'est une gastrite atrophante
- b- Associée à des maladies auto immunes
- c- L'Atteinte de l'antra est exclusive
- d- Le traitement à la vitamine B 12 est à vie

34) Le carcinome hépato cellulaire est recherché systématiquement devant : (la réponse fausse)

- a- Une embolie pulmonaire
- b- Une hypoglycémie
- c- Une fièvre chez le cirrhotique
- d- Une polyglobulie
- e- Une diminution des alphas foeto-protéines inférieur à 500 ng/ml

35) La contamination de la tuberculose intestinale se fait par : (la réponse fausse)

- a- Dissémination hématogène
- b- Foyer génital de voisinage infecté
- c- Ingestion de BK directes à partir d'aliments souillés
- d- Lymphatique

36) Dans la définition de la maladie cœliaque on doit avoir : (la ou les réponses justes)

- a- Un syndrome clinique et biologique de malabsorption
- b- Une atrophie villositaire
- c- Une lientérie
- d- Une régression après régime sans gluten
- e- Des glaires dans les selles

37) La définition de la diarrhée chronique c'est : (la ou les réponses justes)

- a- Une durée supérieure à 8 semaines
- b- Le poids des selles supérieur à 300 gr/j
- c- Une durée supérieure à 4 semaines
- d- Le poids des selles supérieur à 600 gr/j
- e- L'altération de l'état général

38) Dans la maladie de Crohn : (la réponse fausse)

- a- Le tabac est un facteur favorisant
- b- La chirurgie empêche les récives
- c- Le flagyl est indiqué
- d- Il y a un risque très élevé de fistules
- e- En cas de poussées La dénutrition est présente

39) La localisation préférentielle de la maladie de Crohn est : (la réponse juste)

- a- Iléale
- b- Gastriques
- c- Œsophagiennes
- d- Anales
- e- Sigmoidienne

MAGIC - SERVICE  
BOUBBEKEUR

40) Lors d'une pancréatite chronique un amaigrissement est secondaire à : (cochez la réponse fausse)

- a- Une malabsorption
- b- Un cancer du pancréas
- c- Une splénomégalie associée
- d- Un diabète
- e- Une conséquence de l'alcoolisme

41) Le CHC peut être révélé par : (la réponse fausse)

- a- Un hémopéritoine
- b- Une augmentation de l'alpha foetoprotéines
- c- Une embolie pulmonaire
- d- Une splénomégalie
- e- Une thrombose portale

MAGIC - SERVICE  
BOUBBEKEUR

42) Lors du CHC la transplantation hépatique est indiquée si : (la réponse fausse)

- a- L'âge inférieur à 65 ans
- b- Cirrhose quel que soit le stade du CHILD
- c- Un nodule inférieur à 7 cm
- d- Une absence d'extension vasculaire

43) La maladie de Biermer : (la réponse fausse)

- a- Est une maladie auto-immune
- b- Il faut rechercher un diabète et une dysthyroïdie
- c- Le myélogramme retrouve une moelle pauvre en mégalo-blaste
- d- Il y a une glossite et une sécheresse de la bouche

BOUBBEKEUR



44) Dans la tuberculose intestinale Le transit du grêle retrouve: (la réponse fausse)

- a- Une rétraction du bas fond caecal
- b- Un rétrécissement du grêle avec dilatation en amont
- c- Une colectasie
- d- Une fistule entéro-colique

45) Le traitement de la tuberculose impose d'adjoindre l'ethambutol pour : (la réponse fausse)

- a- Une tuberculose rénale
- b- Une tuberculose méningée
- c- Une tuberculose osseuse
- d- Une tuberculose ganglionnaire
- e- Une tuberculose péricardique

46) Dans la diarrhée par malabsorption par atteinte du grêle proximal : (la réponse fausse)

- a- Le test au D xylose est positif
- b- Il existe une carence en vitamine D
- c- Il existe une carence en folates
- d- Il existe une carence en vitamine K

47) La classification de METAVIR : cocher la ou les réponses justes

- a- Intéresse les lésions hépatiques.
- b- Grade la fibrose de F0 à F4
- c- Grade l'activité par la nécrose portale et la nécrose lobulaire.
- d- Grade la cirrhose en F3

48) La ponction biopsie hépatique : cocher la ou les réponses fausses

- a- Ramène un échantillon de la lésion.
- b- Est indispensable pour poser le diagnostic de l'hépatite chronique.
- c- Est un examen cytologique.
- d- Peut être non concluante.

49) Le papillome est, une tumeur :cocher la ou les réponses fausses.

- a- Benigne
- b- Maligne
- c- Siège dans le colon
- d- Siège dans l'œsophage

50) La dysplasie dans le tube digestif peut être : cocher la ou les réponses fausses

- a- De haut grade
- b- Une lésion précancéreuse
- c- Franchir la lame basale
- d- Un cancer in situ