

EXAMEN FINAL DU MODULE DE GASTROENTEROLOGIE

Le 09 Avril 2015

- 1) Le virus de l'hépatite B peut être transmis (réponse fausse)
- a- Ingestion d'aliments souillés
  - b- Transfusion de produits sanguins contaminés
  - c- Soins dentaires
  - d- Voie sexuelle
  - e- De mère contaminée au nouveau née
- 2) Tous ces signes peuvent se voir à la phase pré-ictérique lors d'une hépatite virale aigue sauf un :
- a- Fièvre
  - b- Asthénie
  - c- Arthralgie
  - d- Vomissements
  - e- Hépatomégalie
- 3) en cas de co-infection hépatite B – hépatite D le bilan sérologique retrouve (réponse juste)
- a- Ag HBs positif, ac anti HBc type IgG positif, ac anti type IgG positif
  - b- Ag HBs positif, ac anti HBc type IgM positif, ac anti type IgM positif
  - c- Ag HBs positif, ac anti HBc type Ig G positif, ac anti type IgM positif
  - d- Ag HBs négatif, ac anti HBc type IgM négatif, ac anti type IgM positif
  - e- Ag HBs négatif, ac anti HBc type IgM négatif, ac anti type IgM positif
- 4) La gastrite chronique atrophiante : Quelle est la réponse fausse
- a- Expose au risque du cancer de l'estomac
  - b- Nécessite une surveillance endoscopique régulière
  - c- Peut-être causé par les anti-inflammatoires non stéroïdiens
  - d- Est due le plus souvent à l'helicobacterpylori
- 5) Chez un cirrhotique connu, tous ces examens permettent la recherche de signes d'hypertension portale, sauf un lequel ?
- a- Fibroscopie oeso-gastroduodénale
  - b- Ponction biopsie du foie
  - c- Echographie abdominale
  - d- Mesure de la pression sus-hépatique bloquée
  - e- Echodoppler vasculaire

- 6) Concernant l'hépatite virale aiguë B, une de ces propositions est fautive laquelle ?
- a- Peut se transmettre par voie sanguine
  - b- Peut être asymptomatique
  - c- Ne passe jamais à la chronicité
  - d- Peut donner un tableau d'hépatite aiguë grave
  - e- La transmission mère enfant est possible
- 7) Concernant la cirrhose hépatique d'origine virale C quelle est la proposition juste ?
- a- Est toujours symptomatique décompensée
  - b- S'accompagne toujours d'un ictère.
  - c- Prédipose à la survenue d'un carcinome hépatocellulaire
  - d- Est toujours mortelle en moins de 5 ans
  - e- Guérit après un traitement par les antiviraux prescrit pendant une année
- 8) Ces manifestations se rencontrent au cours l'hémochromatose génétique, sauf un, lequel ?
- a- Diabète
  - b- Cardiomyopathie
  - c- Mélanodermie
  - d- Arthropathies
  - e- Anneau de Kayser- Fleisher
- 9) Devant une ascite quel est parmi ces signes celui qui oriente vers une cirrhose du foie :
- a- Douleur de l'hypochondre droit
  - b- Souffle hépatique
  - c- Un liquide d'ascite riche en protéide
  - d- Une erythrose palmaire
  - e- Une hépatomégalie douloureuse
- 10) Une ascite est dite exsudative si :
- a- Le taux d'albumine dans le liquide d'ascite est supérieur à 30g/l
  - b- Le taux d'albumine dans le liquide d'ascite est inférieur à 30g/l
  - c- Présence de germes à l'examen bactériologique du liquide d'ascite
  - d- Le taux d'amylase dans le liquide d'ascite est élevé
  - e- Présence d'un taux de leucocytes supérieurs à 1000/mm<sup>3</sup> dans le liquide d'ascite
- 11) Concernant l'ascite cloisonnée, quelle est la proposition fautive ?
- a- C'est une ascite exsudative
  - b- Donne une matité en damier
  - c- Le signe du Flot est positif
  - d- L'échographie abdominale permet le diagnostic positif
  - e- Peut être secondaire à une tuberculose péritonéale

12) Quel est la complication possible de l'amibiase intestinale parmi ces affections ?

- a- Dégénérescence au niveau du colon
- b- Occlusion intestinale haute
- c- Abscès hépatique
- d- Atrophie villositaire
- e- Fistule anale

13) Selon la classification ROME III, les troubles fonctionnels intestinaux comprennent : (quelle est la réponse fausse ?)

- a- Syndrome de l'intestin irritable
- b- Ballonnement fonctionnel
- c- Dyspepsie fonctionnelle
- d- Constipation fonctionnelle
- e- Diarrhée fonctionnelle

14) Dans le syndrome de l'intestin irritable, vous demandez les examens para cliniques si (La réponse fausse) ?

- a- Antécédents familiaux de cancer colique
- b- Masse abdominale à l'examen
- c- A tous les âges
- d- Aggravation récente d'une symptomatologie ancienne
- e- Présence d'un amaigrissement

15) le diagnostic biologique d'une parasitose intestinale se fait par : (la réponse juste)

- a- hyper éosinophilie
- b- hyperleucocytose
- c- syndrome de choléstase
- d- Syndrome de cytolyse

16) Tous ces signes sont retrouvés dans la pancréatite chronique sauf un:

- a- Un ictère
- b- Un épanchement pleural
- c- Une stéatorrhée
- d- Une douleur épigastrique
- e- Une splénomégalie

17) Les faux kystes du pancréas : (la réponse fausse)

- a- Peuvent fistuliser dans les organes creux de voisinage
- b- Donnent des hémorragies digestives
- c- Sont traités définitivement par ponction
- d- Peuvent s'infecter

- 18) On évoque une maladie de Crohn chez un malade ayant une diarrhée chronique avec  
(la réponse fausse)
- a- Ulcérations coliques sans intervalles de muqueuse saine
  - b- Une atteinte iléale
  - c- Présence d'un abcès cryptique à la biopsie
  - d- Présence de granulome tuberculoïde sur les biopsies
- 19) Dans la maladie de Crohn il y a des manifestations extra intestinales qui sont les suivantes  
sauf : (la réponse fausse)
- a- Un erythème noueux
  - b- Une cholangite sclérosante
  - c- Une splénomégalie
  - d- Un pyoderma gangréneux
- 20) La maladie de Crohn : (la réponse fausse)
- a- Une maladie chronique du tube digestif entier
  - b- Il existe une prédisposition familiale
  - c- Il y a une atteinte transmurale
  - d- Il n'y a pas d'atteintes périnéales
- 21) Dans la maladie de Biermer il existe dans le sérum : (la réponse juste)
- a- Un anticorps anti muscle lisse
  - b- Un anticorps Anti cellules pariétales
  - c- Un anticorps Anti mitochondries
  - d- Un anticorps Antinucléaire
- 22) Dans la maladie de Biermer : (la réponse fausse)
- a- C'est une gastrite atrophiante
  - b- Associée à des maladies auto immunes
  - c- L'Atteinte de l'antré est exclusive
  - d- Le traitement à la vitamine B 12 est à vie
- 23) Le carcinome hépato cellulaire est recherché systématiquement devant : (la réponse fausse)
- a- Une embolie pulmonaire
  - b- Une hypoglycémie
  - c- Une fièvre chez le cirrhotique
  - d- Une polyglobulie
  - e- Une diminution des alphas foeto-protéines inférieur à 500 ng/ml
- 24) La contamination de la tuberculose intestinale se fait par : (la réponse fausse)
- a- Dissémination hématogène
  - b- Foyer génital de voisinage infecté
  - c- Ingestion de BK directes à partir d'aliments souillés
  - d- Lymphatique

- 25) Le traitement de la tuberculose impose d'ajouter l'ethambutol pour : (la réponse fautive)
- a- Une tuberculose rénale
  - b- Une tuberculose méningée
  - c- Une tuberculose osseuse
  - d- Une tuberculose ganglionnaire
  - e- Une tuberculose péricardique
- 26) Dans la diarrhée par malabsorption par atteinte du grêle proximal : (la réponse fautive)
- a- Le test au D xylose est positif
  - b- Il existe une carence en vitamine D.
  - c- Il existe une carence en folates
  - d- Il existe une carence en vitamine K.
- 27) Dans une lésion caustique le facteur pronostic le plus important est ? la réponse juste
- a- L'état psychique du patient.
  - b- La quantité de produit ingéré.
  - c- La nécrose de l'arbre trachéobronchique.
  - d- La péritonite.
  - e- La nature du produit.
- 28) A partir de quel stade peut se développer ultérieurement une sténose de l'œsophage ?
- a- II a
  - b- II b
  - c- III
  - d- IV
  - e- I
- 29) Parmi ces facteurs de risque du cancer de l'œsophage quel (s) est (sont) qui est (sont) en rapport avec les antécédents du patient.
- a- Achalasie.
  - b- Tabagisme et alcoolisme.
  - c- Brûlure caustique.
  - d- Endobrachyoesophage.
  - e- Ulcère de Barrett.
- 30) Tous ces examens font partie du bilan d'extension du cancer de l'œsophage sauf un lequel ?
- a- Le scanner thoraco-abdominal.
  - b- La fibroscopie trachéobronchique.
  - c- L'écho endoscopie.
  - d- L'artériographie cœliomésentérique.
  - e- L'examen ORL.

31) La résecabilité du cancer de l'œsophage dépend de : la ou les réponses fausses

- a- Le siège de la tumeur.
- b- L'extension intra-murale.
- c- Présence de métastases.
- d- L'état général du patient (OMS).
- e- La fonction respiratoire du patient.

32) Quels sont les signes de la perforation bouchée : la ou les réponses justes

- a- Absence de pneumopéritoine.
- b- Présence d'un pneumopéritoine résiduel.
- c- Disparition de la contracture.
- d- Réapparition de la douleur de nouveau signant la récurrence.
- e- Les signes peuvent prêter à confusion avec une crise ulcéreuse hyperalgique.

33) La classification de Forrest nous renseigne sur : la réponse juste

- a- L'origine du saignement.
- b- Le risque de récurrence.
- c- L'attitude thérapeutique.
- d- Le saignement lui-même.
- e- Le risque de complications.

34) Toutes ces maladies peuvent être à l'origine d'un carcinome hépatocellulaire sauf une laquelle ?

- a- L'hémochromatose.
- b- La cirrhose alcoolique.
- c- Hépatite B.
- d- Maladie de Wilson.
- e- Hypertension portale.

35) Le toucher rectal trouve tout son intérêt dans : la ou les réponses justes

- a- L'appréciation de la distance entre le pôle supérieur de la tumeur et la marge anale.
- b- L'évaluation de la fixité par rapport au plan postérieur.
- c- Le bilan d'extension.
- d- Le bilan diagnostique.
- e- Le bilan préthérapeutique.

36) La hernie directe se caractérise par : la ou les réponses justes

- a- La faiblesse de la paroi.
- b- Le risque de récurrence.
- c- La fréquence élevée chez le sujet âgé.
- d- Le siège en dedans des vaisseaux épigastriques.
- e- L'étiologie congénitale.

37) Une hernie étranglée donne tous ces signes sauf un lequel ?

- a- Vomissements.
- b- Douleur.
- c- Arrêt des matières et des gaz.
- d- Diarrhée.
- e- Irréductibilité.

38) La hernie crurale est le plus souvent : la ou les réponses fausses

- a- Fréquente chez la femme.
- b- Située au dessous de la ligne de Malgaigne.
- c- Associée à un risque d'étranglement.
- d- De volume important.
- e- Oblique externe.

39) Les hémorroïdes se caractérisent en général par : les réponses justes

- a- La thrombose.
- b- La douleur.
- c- L'hémorragie.
- d- L'irréductibilité.
- e- Le prolapsus.

40) Le papillome est une tumeur : (cochez la ou les réponses justes)

- a- Benigne
- b- Maligne
- c- Siège dans le colon
- d- Siège dans l'œsophage

41) Les critères histo-pronostiques des tumeurs digestives sont : (cochez la ou les réponses justes)

- a- L'IRM
- b- Le degré de la différenciation tumorale
- c- Le stade TNM
- d- Le type tumoral

42) La ponction biopsie hépatique : (cochez la ou les réponses justes)

- a- Ramène un échantillon de la lésion
- b- Est indispensable pour poser le diagnostic de l'hépatite chronique
- c- Est un examen cytologique
- d- Peut être non concluante

43) La fibrose de l'hépatite chronique : (cochez la ou les reponses justes)

- a- Peut dessiner des ponts
- b- Peut dessiner des tunnels
- c- Peut dessiner des septas
- d- Peut dessiner des routes

44) La symptomatologie de la lithiase vésiculaire est faite de :

- a- Douleur de l'hypochondre droit déclenchée par les repas - Fièvre - Vomissements.
- b- Douleur de l'hypochondre droit - Iléus paralytique - Nausées.
- c- Douleur de l'hypochondre gauche à début brutal - Nausées et Vomissements - général conservé.
- d- Douleur de l'hypochondre droit à début brutal - Nausées et Vomissements - général conservé.
- e- Défense de l'hypochondre droit - Fièvre - Vomissements.

45) Parmi les propositions suivantes, quelles sont celles qui ne correspondent pas au cancer des voies biliaires extra-hépatiques ? :

- a- Contracture de l'hypochondre droit - Amaigrissement.
- b- La dilatation kystique des voies biliaires est une affection prédisposante au cancer des voies biliaires.
- c- Masse de l'hypochondre droit.
- d- L'ictère est de type non retentionnel.
- e- La tumeur du hile hépatique est appelée : tumeur de Klatskin.

46) Les examens complémentaires les plus performants pour le diagnostic du cancer des voies biliaires extra-hépatiques sont :

- a- Dosage des phosphatases alcalines.
- b- Cholangiographie par cathétérisme rétrograde endoscopique (CPRE) avec biopsie ou prélèvement cytologique.
- c- Fibroscopie gastroduodénale
- d- Bili - IRM
- e- Anglo-scanner.

47) Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui correspond à la symptomatologie de la lithiase de la voie biliaire principale ? :

- a- Douleur de l'hypochondre droit - fièvre - altération de l'état général
- b- Frissons - vomissements - Ictère
- c- Douleur de l'hypochondre droit - Fièvre - Ictère
- d- Fièvre - Ictère - douleur de l'hypochondre droit
- e- Douleur de l'épigastre - Fièvre - Ictère

48) Au cours du cancer du colon, quelles sont les propositions justes :

- a- La pancolrectomie est la résection collique complète.
- b- La colostomie de dérivation est une méthode palliative de traitement du cancer collique.
- c- Les métastases hépatiques synchrones sont découvertes à distance du diagnostic de tumeur primitive du colon.
- d- La colectomie segmentaire est le traitement de choix du cancer collique.
- e- La dérivation interne est une méthode radicale dans le traitement du cancer du colon.

49) Quelles sont les

- a- Cirrhose
- b- Cholangite
- c- Angiocholite
- d- Cancer du pancréas
- e- Pancréatite

50) Au cours du

- a- Les tumeurs
- b- Les tumeurs
- c- Le cancer
- d- Les tumeurs
- e- La perforation



49) Quelles sont les complications de la lithiase de la voie biliaire principale ? :

- a- Cirrhose primitive du foie
- b- Cholangite sclérosante
- c- Angiocholite aigue
- d- Cancer des voies biliaires
- e- Pancréatite aigue

50) Au cours du cancer du colon, quelles sont les propositions justes :

- a- Les tumeurs carcinoïdes sont les plus fréquentes
- b- Les tumeurs du tissu conjonctif sont rares
- c- Le cancer du colon peut être révélé par une occlusion
- d- Les tumeurs du colon transverse sont révélées par une occlusion
- e- La perforation diastasique est une perforation collique située à distance de la tumeur.