

UNIVERSITE ABOU BEKER BELKAID Tlemcen

Faculté de médecine

EXAMEN DE RATRAPPAGE

MODULE DE GASTRO-ENTEROLOGIE

Année universitaire 2015-2016

Le 04 Septembre 2016

La durée : 01h30

Compter type
0

1) La dysphagie doit faire rechercher un cancer de l'œsophage :(cochez la réponse fausse)

- a- Quand elle s'accompagne de vomissements.
- b- Quand elle s'accompagne d'une dysphonie.
- c- Quand elle est paradoxale. X
- d- Quand elle survient progressivement.
- e- Quand elle survient chez un homme de plus de 50 ans alcoolique et tabagique.

2) La fibroscopie nous apporte un renseignement important : (cochez la réponse fausse)

- a- Sur l'aspect de la tumeur.
- b- Sur la distance de la tumeur par rapport aux arcades dentaires.
- c- Sur le type histologique de la tumeur. X
- d- Sur la présence ou l'absence d'une muqueuse de Barrett.
- e- L'état de la paroi gastrique en vue d'une éventuelle gastroplastie.

3) Quand vous examinez un patient qui présente une perforation d'ulcère un de ces éléments retient votre attention : (cochez la réponse juste)

- a- La disparition de la matité pré hépatique.
- X b- La contracture abdominale. X
- c- La matité des flancs.
- d- La douleur au toucher rectal.
- e- La sensibilité abdominale en cas de perforation bouchée.

- 4) Parmi les diagnostics différentiels de la péritonite par perforation d'ulcère chez un adulte jeune de sexe masculin quel est le moins probable :
- a- La péritonite appendiculaire.
 - b- La péritonite biliaire.
 - c- La pancréatite aigue
 - d- La perforation collique.
 - e- La crise ulcéreuse hyperalgique.
- 5) Chez un cirrhotique connu, tous ces examens permettent la recherche de signes d'hypertension portale, sauf un lequel ?
- a- Fibroscopie oeso-gastroduodénale.
 - b- Ponction biopsie du foie.
 - c- Echographie abdominale.
 - d- Mesure de la pression sus-hépatique bloquée.
 - e- Echo doppler vasculaire.
- 6) Concernant l'hépatite virale aigue B, une de ces propositions est fausse laquelle ?
- a- Peut se transmettre par voie sanguine.
 - b- Peut être asymptomatique.
 - c- Ne passe jamais à la chronicité.
 - d- Peut donner un tableau d'hépatite aigue grave.
 - e- La transmission mère enfant est possible.
- 7) Concernant la cirrhose hépatique d'origine virale C quelle est la proposition juste ?
- a- Est toujours symptomatique décompensée.
 - b- S'accompagne toujours d'un ictère.
 - c- Prédipose à la survenue d'un carcinome hépatocellulaire. (hépatite B)
 - d- Est toujours mortelle en moins de 5 ans.
 - e- Guérit après un traitement par les antiviraux prescrits pendant une année.
- 8) Concernant l'ascite cloisonnée, quelle est la proposition fausse ?
- a- C'est une ascite exsudative.
 - b- Donne une matité en damier.
 - c- Le signe du Flot est positif.
 - d- L'échographie abdominale permet le diagnostic positif.
 - e- Peut être secondaire à une tuberculose péritonéale.

9) Indiquer parmi les éléments cliniques suivants celui qui ne caractérise pas un syndrome ulcéreux :

- a - La douleur est une crampe
- b - Son siège est épigastrique
- c - Son irradiation est scapulaire droite
- d - L'alimentation calme la douleur
- e - Son horaire est post-prandial

10) Dans une perforation d'ulcère duodénal en péritoine libre, vue dans les 12 premières heures, on observe typiquement :

- a - La contracture abdominale
- b - Un collapsus cardio-vasculaire
- c - La disparition de la matité pré-hépatique à la percussion
- d - Une température supérieure à 38,5 °C
- e - Une douleur au toucher rectal

11) Une ascite riche en protéine Rivalta positif évoque :

- a - Un cavernome portal congénital
- b - Un syndrome néphrotique aigue
- c - Une tuberculose péritonéale
- d - Une carcinose péritonéale
- e - Une surinfection de l'ascite chez un cirrhotique

12) Parmi les résultats biologiques suivants, l'un d'eux fait redouter, au cours d'une hépatite aiguë, une évolution fulminante :

- a- Les transaminases ont un taux qui dépasse 2 000 UI/l
- b- Les gammaglobulines ont un taux qui dépasse 20 g/l
- c- La bilirubine totale a un taux qui dépasse 80 micromol/l
- d- Le taux de prothrombine est inférieur à 10 %
- e- Les gamma GT ont un taux égal au triple de la normale

13) Peuvent être associés à un ulcère duodénal les éléments suivants sauf un. Lequel ?

- a- Un autre ulcère duodénal
- b- Un ulcère gastrique
- c- Une duodénilite érosive
- d- Une atrophie du fundus
- e- Une antrite érosive

14) Ce patient présente un tableau typique de perforation ulcéreuse gastrique. Vous pouvez avoir recours à divers examens complémentaires pour le confirmer, sauf un qui est contre-indiqué. Indiquez lequel :

- a - Radiographie de l'abdomen sans préparation debout, de face
- b - Radiographie de l'abdomen sans préparation couché, de profil
- c - Fibroscopie œso-gastro-duodénale
- d - TransitOGD opaque aux hydro-solubles

15) Pour établir le diagnostic positif d'hépatite A, l'argument décisif est apporté par :

- a - Le caractère épidémique de l'hépatite
- b - L'élévation modérée des transaminases
- c - La découverte du virus dans les selles
- d - L'élévation des anticorps anti-HA IgG
- e - L'élévation des anticorps anti-HA IgM

26) l'exploration des troubles fonctionnels intestinaux doit être proposée devant (cochez la réponse fausse) :

- a- L'existence d'un amaigrissement
- b- L'existence d'une anémie
- c- Sujet âgé de moins de 40 ans
- d- L'existence d'une masse abdominale
- e- Notion familiale de cancer colique

27) Les symptômes qui peuvent révéler un cancer du rectum peuvent être les suivants sauf un :

- a- Une rectorragie
- b- Une anémie
- c- Un syndrome rectal
- d- Un syndrome occlusif
- e- Un syndrome de Koenig

28) L'examen physique dans le cancer du rectum peut retrouver les éléments suivants sauf un :

- a- Une formation ulcéro bourgeonnante à base indurée perçue au toucher rectal
- b- Une formation bourgeonnante à base indurée saignante au moindre contact
- c- Le toucher rectal peut ne rien percevoir
- d- Une infiltration de la cloison recto vaginale chez la femme aux touchers pelviens
- e- Une circulation collatérale abdominale

29) Dans les ictères chirurgicaux : cocher la ou les réponses justes

- a- Il s'agit d'un ictère à bilirubine libre
- b- L'absence de bile dans l'intestin entraîne un défaut d'absorption de vitamines hydrosolubles
- c- Les selles sont décolorées par diminution fécale d'urobiline
- d- Le risque majeur des ictères par rétention à court terme est l'insuffisance hépatocellulaire et l'angiocholite
- e- Le test de Koller devient positif après administration de vitamine K per os

30) Parmi les propositions suivantes, quelle est celle qui correspond à la

symptomatologie de la cholécystite aiguë lithiasique ? :

- a- Défense de l'hypochondre gauche - Fièvre - nausées, vomissements
- b- Contracture de l'hypochondre droit - masse de la région de l'hypochondre droit
- c- Grosse vésicule palpable - altération de l'état général
- d- Contracture de l'hypochondre droit - ictère - Décoloration des selles
- e- Défense de l'hypochondre droit - Fièvre - Nausées, vomissements.

31) Quelle est la proposition qui correspond à la symptomatologie du cancer du colon non compliqué :

- a- Diarrhées, constipation - Vomissements - altération de l'état général
- b- Diarrhée - Altération de l'état général - Contracture abdominale
- c- Douleur abdominal diffuse - Abdomen météorisé - vomissements
- d- Alternance de constipation et de diarrhée - Coliques intermittentes - Rectorragies.
- e- Sensation de gêne ou de pesanteur - transit intestinal normal.

32) Quelle est la symptomatologie de la lithiase de la voie biliaire principale ? :

- a- Douleur de l'hypochondre droit - fièvre - altération de l'état général
- b- Frissons - vomissements - ictère
- c- Douleur de l'hypochondre droit - Fièvre - ictère
- d- Fièvre - ictère - douleur de l'hypochondre droit
- e- Douleur de l'épigastre - Fièvre - ictère

33) Quel profil sérologique correspond à un portage chronique actif d'un virus B sauvage ? (réponse juste)

- a- Ag HBs positif, AgHBe positif, DNA viral élevé, transaminases élevées
- b- Ag HBs positif, AgHBe négatif, DNA viral élevé, transaminases normales
- c- Ag HBs négatif, AgHBe positif, DNA viral bas, transaminases élevées
- d- Ag HBs positif, AgHBe négatif, DNA viral ~~bas~~, transaminases normales
- e- Aucune de ces propositions

34) Une hémorragie digestive est dite haute si son origine est (donner la réponse juste) :

- a- Au dessous de la valvule de Bauhin
- b- Au dessus de l'ombilic
- c- Au dessus de l'angle de Treitz
- d- En dedans du genu inféris
- e- Toutes les réponses sont fausses

35) Lequel des signes cliniques suivants est pathognomonique d'une péritonite ?

- a- Douleur abdominale aigue
- b- Défense épigastrique
- c- Distension abdominale
- d- Contracture abdominale généralisée invincible et permanente en « ventre de bois »
- e- Ondulations péristaltiques à jour frisant

36) La pancréatite aiguë se caractérise par les données suivantes, sauf une, laquelle ?

- a- elle peut être observée chez l'éthylique
- b- elle peut être diagnostiquée grâce à l'élévation de la lipase
- c- l'hypocalcémie est un signe de gravité
- d- elle peut être en rapport avec l'enclavement d'un calcul au niveau de l'ampoule de Vater
- e- l'hémorragie digestive fait partie des signes cliniques d'appel

37) Indiquer la proposition fausse concernant le cancer de l'œsophage :

- a- Entraîne la mort à 5 ans de plus de 80 % des malades
- b- La radiographie est l'examen le plus sensible
- c- Est associé à l'alcoolisme et au tabagisme
- d- La radiothérapie est un des traitements
- e- Est rarement un adénocarcinome

38) Devant un
signes suivants

- a-
- b-
- c-
- d-
- e-

39) C
(tent
prépa

40) le cancer

- a- Est l
- b- Est p
- c- L'int
- d- L'ass
- e- La d

38) Devant une péritonite aigue généralisée, on retiendra en faveur de son origine appendiculaire tous les signes suivants sauf un, lequel ?

- a- Pneumopéritoine à l'ASP
- b- Existence d'une fièvre au début
- c- Début des signes au niveau de la fosse iliaque droite
- d- Antécédents de crises douloureuses de la fosse iliaque droite
- e- Epaissement de la paroi appendiculaire à l'échographie

39) Quel (s) est (sont) parmi les éléments radiologiques suivants celui (ceux) qui vous permet (tent) de diagnostiquer une occlusion de l'intestin grêle sur les clichés simples d'abdomen sans préparation ?

- a- Images hydroaériques centrales
- b- Images hydroaériques plus hautes que larges
- c- Présence d'haustrations épaissies sur les parois des anses distendues
- d- Aérobilie
- e- Croissant clair gazeux sous-diaphragmatique

40) le cancer de l'œsophage se caractérise par : (cochez la réponse fausse)

- a- Est le plus souvent localisé au 1/3 inférieur de l'œsophage
- b- Est principalement un adénocarcinome au niveau du 1/3 inférieur de l'œsophage
- c- L'intoxication alcoolotabagique est fréquemment retrouvée
- d- L'association à un cancer ORL synchrone ou métachrone fréquente
- e- La dysphagie est un symptôme précoce

Bonne chance.