

Université abou-bakr belkaid

année universitaire 2012/2013

Faculté de médecine

Nom : BENAMMOUR prénom : SARRA

Date et lieu de naissance : 04 10 1991 MAGHNIA

Deuxième EMD de sémiologie

Corrigé
Type

- / 1) La fièvre est (réponse juste) :
- a- Un équilibre thermique entre thermogénèse et thermolyse
 - b- Hypothermie centrale
 - c- Due à l'action des substances pyrogènes en cas d'hyperthyroïdie
 - d- D'origine toujours infectieuse
 - e- Hyperthermie > 37.5°C le matin et >37.8°C le soir /
- 2) Les causes infectieuses d'une fièvre aigue sont, sauf :
- a- Angiocholite aigue
 - b- Tétanos /
 - c- Sepsis aigue
 - d- Méningite aigue
 - e- Pneumonie franche lobaire aigue
- 3) Les conséquences de la fièvre sont, sauf :
- a- Convulsions chez le nourrisson
 - b- Déshydratation
 - c- Hypo catabolisme protidique /
 - d- Augmentation du débit cardiaque
 - e- Augmentation du rythme respiratoire
- 4) L'hygiène hospitalière fait appel aux mesures suivantes, sauf :
- a- Un lavage des mains adapté aux soins
 - b- Un local bien adapté
 - c- Des instruments à usage unique /
 - d- Un poste de lavage des mains, équipé
 - e- Une tenue adaptée
- / 5) Une splénomégalie homogène dépassant le rebord costal sans dépasser la ligne passant par l'ombilic correspond à (la ou les réponses justes)
- a- Une splénomégalie stade I
 - b- Une splénomégalie stade II /
 - c- Une splénomégalie stade III
 - d- Une splénomégalie stade IV

E

b

C

C

b

6) Une adénopathie inflammatoire est : (la ou les réponses justes)

- a- Compressive /
- b- Mobile
- c- Douleuruse /
- d- Symétrique /

(b)

7) Les signes cliniques au cours d'une anémie par carence en fer : (la ou les réponses justes)

- a- Asthénie
- b- Chute de cheveux
- c- Tachycardie
- d- Erythrose faciale

a . b . c

8) L'hyponatrémie est le témoin de : (la réponse juste)

- a- Hyperhydratation intracellulaire
- b- Hyperhydratation extracellulaire
- c- déshydratation intracellulaire
- d- déshydratation extracellulaire
- e- Toutes les réponses sont fausses

(a)

9) Le syndrome néphrotique est définie par : (la rep juste)

- a- Albuminémie inférieure 30g/l, protidémie inf 60g/l et une protéinurie sup 3 g/24 h
- b- Albuminémie inférieure 30g/l, protidémie inf 60g/l et une protéinurie sup 3 g/l
- c- Albuminémie inférieure 30g/l, hématurie, hypertension artérielle
- d- Albuminémie inférieure 30g/l, hématurie, insuffisance rénale
- e- Toutes les réponses sont fausses

10) Le syndrome néphrotique se caractérise par : (la ou les rep justes)

- a- HTA isolée *long*
- b- Début *brutal* avec protéinurie, hématurie, HTA et œdèmes généralisés
- c- Début progressif avec œdèmes généralisés
- d- Protéinurie isolée
- e- Toutes les réponses sont fausses

(b)

11) Les œdèmes rénaux sont : (la ou les rep justes)

- a- Dures ne prenant pas le godet
- b- Blancs généralisés prenant le godet
- c- Rouges douloureux localisés
- d- Toutes les réponses sont fausses

(b)

blancs et mous, déclins, généralisés, prendant le godet, se situent pas sur le godet

- 12) L'hématurie d'origine néphrologique est : (la rep juste)
- a- Facilement coagulable contenant des globules rouges jeunes
 - b- Non coagulables contenant des GR déformés et des cylindres hématiques
 - c- Toujours microscopique
 - d- Toutes les réponses sont justes
- (b)
- 13) Quels sont parmi les suivantes, les affirmations exactes concernant la colique néphrétique ? (la ou les rep justes)
- a- la douleur est de siège lombaire
 - b- l'irradiation de la douleur est ascendante
 - c- la douleur évolue par poussée et rémission
 - d- la crise ne s'accompagne pas d'un état d'agitation
- (a) (c)
- 14) A propos de la rétention aiguë d'urine, (cochez les réponses justes) :
- a- la douleur est de type de sensation de besoin d'uriner
 - b- le globe vésical est sonore à la percussion
 - c- la douleur siège au niveau de l'hypochondre droit
 - d- la douleur siège au niveau de l'hypogastre
- (a) (d)
- 15) Lors de la torsion du testicule, (cochez la réponse juste) :
- a- la douleur est d'apparition progressive
 - b- la douleur s'accompagne toujours de symptômes urinaires
 - c- le siège de la douleur est scrotal avec irradiation le long du cordon spermatique
 - d- l'hyperthermie est constante
- (c)

15) Un gros rein se traduit toujours par un contact lombaire positif

- a- Vrai
- b- Faux

16) L'Exploration échographique vésico-prostatique est réalisée en réplétion vésical

- a- Vrai
- b- Faux

17) Quelles sont les propositions justes :

- a- L'eczéma est une vésicule.
- b- La gale est exprimée par une bulle.
- c- La tumeur cutanée est exprimée souvent par une ulcération.
- d- L'érythème noueux est un nodule.
- e- Le vitiligo est une papule.

a.c.d

18) L'acné est une (la ou les réponses justes)

- a- Pustule microbienne.
- b- Pustule amicrobienne.
- c- Une pathologie hormonale.
- d- Atteint l'adulte jeune.
- e- Se voit même au niveau du cuir chevelu.

b.c.d

19) Le psoriasis est une dermatose fréquente en dermatologie ; classée comme :

- a- Des lésions vésiculeuses.
- b- Des lésions pustuleuses.
- c- Des lésions érythémateux-squameuses.
- d- Des lésions nodulaires.
- e- Une pathologie d'évolution aiguë.

(C)

20) Une hématurie est : (cochez la réponse juste)

- a) -Un saignement fait de sang rouge.
- b) -Un rejet de sang par la bouche au cours d'un effort de toux.
- c) -Une émission de sang rouge vif par l'anus.
- d) Un rejet par la bouche de sang au cours d'un effort de vomissement.
- e) Une émission de selles séro-sanguinolentes

(D)

21) L'estimation de la spoliation sanguine au cours d'une hémorragie digestive est faite sur : (cochez la réponse juste).

- a) -Uniquement sur l'état clinique.
- b) -Seulement sur des critères biologiques.
- c) -La quantité de sang rejetée.
- d) -Des critères cliniques, biologiques, et quantitatifs.
- e) -La présence d'un état de choc.

(D)

22) Le méléna se définit comme étant : (cochez la réponse juste)

- a. Une émission de sang rouge par l'anus.
- b. Une émission de sang par la bouche au cours d'un effort de vomissement.
- c. Une émission de selles noires, goudron par l'anus (correspondant à du sang digéré).
- d. Une émission de sang au cours d'un effort de toux.
- e. Elle est toujours associée à une rectorragie.

(C)

23) La douleur d'une lithiase vésiculaire se caractérise par (cochez la réponse fautive)

- a- Une douleur de l'épigastre
- b- A Irradiation postérieure
- c- A Type de crampe
- d- D'Intensité moyenne
- e- Majorée par la prise d'aliments gras

(A)

24) Le signe de Murphy (cochez la réponse juste)

- a- Douleur de l'hypochondre droit
- b- Douleur à l'inspiration
- c- Douleur à l'inspiration profonde
- d- Douleur sous le rebord costal gauche à l'inspiration profonde
- e- Douleur provoquée sous le rebord costal à droite à l'inspiration profonde

(E)

25) Les réctorragies sont définies par (la ou les réponses justes)

- a- des caillots sanguins
- b- un écoulement de sang rouge par l'anus
- c- lésion mettant à nu le sphincter
- d- un écoulement de sang noir par l'anus

(b)

26) La ou les facteurs favorisant les hémorroïdes :

- a- l'âge
- b- aliments riches en fibres
- c- troubles du transit
- d- Les mélénas

(c)

27) Quel est le signe clinique majeur devant une occlusion intestinale

- a- La douleur
- b- l'arrêt des matières et des gaz
- c- La fièvre
- d- Le ballonnement abdominal

Péritonite A.G.

(a)

28) Quel est l'examen complémentaire à demander de première intention

- a- Echographie abdominale
- b- Scanner
- c- Abdomen sans préparation
- d- Doppler vasculaire

(c)

29) les niveaux hydro aériques dans une occlusion du grêle sont

- a- centraux plus large que haut
- b- centraux plus hauts que larges
- c- périphériques plus hauts que large
- d- périphériques plus larges que haut

(a)

30) Dans une appendicite aigue le principal signe clinique est

- a- la fièvre
- b- Troubles du transit
- c- nausées vomissements
- d- la défense de la fosse iliaque droite

(d)

31) Quelle est la complication la plus grave de l'appendicite :

- a- la péritonite aigue
- b- le plastron appendiculaire
- c- Abscès du Douglas
- d- Occlusion intestinale aigue

a

32) Le signe de Blumberg est :

- a- une douleur à la palpation de la fosse iliaque droite
- b- une douleur à la compression de la fosse iliaque gauche
- c- une douleur à la décompression de la fosse iliaque gauche
- d- une douleur à la décompression de la fosse iliaque droite

d

33) Une hernie inguinale non compliquée est

- a- réductible
- b- douloureuse
- c- Non impulsive à la toux
- d- toutes les réponses sont justes

a

34) Quels sont les signes d'étranglement herniaire

- a- La fièvre
- b- Disparition de la douleur
- c- réductibilité de la hernie
- d- toutes les réponses sont fausses

d

35) Une hernie inguinale se situe

- a- au dessus de la ligne de Malgaigne
- b- au dessous de la ligne de malgaigne
- c- Dans la région hypogastrique
- d- Toutes les réponses sont justes

a

36) L'examen clinique lors de la rectorragie recherche : (la ou les réponses justes)

- a- Les signes de choc
- b- Les signes d'hypertension portale
- c- Une fissure ou des hémorroïdes
- d- Une tumeur au TR

37) Lors des rectorragies l'interrogatoire doit rechercher : (la ou les rep fausses)

- a- Une douleur thoracique
- b- Une altération de l'EG
- c- L'existence de médicaments (aspirine)
- d- Une diarrhée récente
- e- Une constipation récente

a. b. c. d

a

38) Dans le syndrome rectal l'épreinte est définie comme :

- a- Tension douloureuse abdominale avec sensation de brûlure
- b- Une envie d'aller à la selle sans rien vider
- c- Une douleur abdominale colique basse et une contraction répétitive
- d- Une douleur abdominale colique haute et une contraction répétitive

(c)

39) Dans les vomissements aigus que faut t'il rechercher (la réponse fausse)

- a- Une sténose du pylore
- b- Une pancréatite aigue
- c- Une appendicite aigue
- d- Une méningite
- e- Une grossesse

(a)

40) Dans la diarrhée aigue : le syndrome dysentérique comprend :

- a- Une diarrhée fécale, une douleur, des hémorroïdes
- b- Une diarrhée glaireuse, un syndrome rectal, une douleur
- c- Une diarrhée glaireuse, un syndrome rectal, des hémorroïdes
- d- Une diarrhée fécale, un syndrome rectal, une douleur

(b)

41) Dans la diarrhée aigue les signes de gravité sont : (la ou les rep justes)

- a- Une fièvre
- b- Les signes de choc
- c- Une défense
- d- Une douleur au TR
- e- Une déshydratation

a.b.c.d.e

42) La dysphagie : (la ou les rep justes)

- a- Est une impossibilité totale de déglutir
- b- Peut être haute ou basse
- c- Est toujours aux solides
- d- Peut s'accompagner de dysphonie

(b) (d)

43) Un ictère cholestatique est caractérisé par : (la ou les rep justes)

- a- Des urines foncées des selles décolorées
- b- Des urines claires et des selles foncées
- c- Une anémie
- d- Un prurit

(a) (d)

44) La douleur ulcéreuse est : (la ou les rep justes)

- a- Le plus souvent de siège épigastrique ✓
- b- Est post-prandiale tardive ✓
- c- A type de crampe ✓
- d- Aggravée par l'alimentation
- e- Calmée par les antiacides ✓

a, b, c

45) Parmi les caractères d'une douleur abdominale indiquez ceux qui font évoquer le diagnostic d'ulcère duodénal : (la ou les rep justes)

- a- Douleur épigastrique calmée par l'émission de gaz
- b- Douleur de l'hypochondre gauche irradiant à l'épaule gauche
- c- Douleur épigastrique post prandiale tardive ✓
- d- Douleur de l'hypochondre droit calmée par la prise d'aspirine
- e- Douleur épigastrique calmée par la consommation d'aliments ✓

c, e

46) Que peut signifier un signe de glaçon positif : (la ou les rep justes)

- a- Une splénomégalie ✓
- b- Une masse abdominale ✓
- c- Une circulation veineuse abdominale
- d- Une hépatomégalie ✓
- e- Une hernie

a, b, d

47) Un signe de flot témoigne de : (la ou les rep justes)

- a- Existence d'une hypertension portale
- b- Existence d'une ascite ✓
- c- D'une propagation d'une onde crée par pression sur la paroi abdominale ✓
- d- L'examen se fait avec l'aide de deux personnes ✓
- e- Retrouve une masse abdominale

b, c, d

48) Le diagnostic différentiel d'une ascite se fait avec : (la ou les rep justes)

- a- un globe vésical ✓
- b- une tumeur ovarienne ✓
- c- un fibrome utérin ✓
- d- une grossesse ✓
- e- un kyste ovarien ✓

a, b, c, d, e

(49) - quels sont les éléments étiologiques du diabète sucré ?

- a - Défaut de l'insuline
- b - Crise de tétanie
- c - Tétanie
- d - Cholestérol et triglycérides
- e - Hépatites à virus de type C

a, b, d, e

(50) - la déficience de l'enzyme chargée de la synthèse de la cholestérol est (la ou les RT)

- a - une déficience en $\alpha 1$
- b - le poids des sels est ≈ 300 g/l
- c - une déficience en $\alpha 2$
- d - le poids des sels est ≈ 600 g/l
- e - l'altération de l'état général

b, c