

## Examen de sémiologie 2<sup>ème</sup> trimestre

---

1 - Le foie assure : (la réponse *fausse*)

- A. La synthèse de l'albumine
- B. La synthèse de la prothrombine
- C. Le stockage du fer et des facteurs antipernicieux
- D. Assure la formation de la bile
- E. La dégradation des globules rouges

2 - Au cours de la cholestase tous ces signes sont présents : (la réponse *fausse*)

- A. Une augmentation des phosphatases alcalines
- B. Une augmentation de la gamma glutamyl transpeptidase
- C. Une hypoalbuminémie
- D. Un test de Kohler positif
- E. Une hyperbilirubinémie

3 - Au cours d'une insuffisance hépatocellulaire on peut rencontrer tous ces signes (la réponse *fausse*)

- A. Une albuminémie à 38 gr/l
- B. Une glycémie à 0,9 gr/l
- C. Une hypocholestérolémie
- D. Un test de Kohler négatif
- E. Une protidémie totale à 54 gr/l

4 - La douleur ulcéreuse typique est caractérisée par tous ces signes sauf un : (la réponse *juste*)

- A. La douleur est postprandiale tardive
- B. Peut s'accompagner de vomissements
- C. La douleur est calmée par l'alimentation
- D. La défense abdominale à l'examen clinique
- E. Elle peut s'accompagner d'une hémorragie digestive

5 - La douleur pancréatique se présente : (la réponse *fausse*)

- A. Comme type de crampe ou de broiement
- B. De siège épigastrique avec des irradiations
- C. D'évolution intermittente
- D. La douleur est calmée par la position en chien de fusil
- E. S'accompagne d'une hyperamylasémie et hyperlipasémie

**6 - Les douleurs rapportées peuvent être en rapport avec : (la réponse *fausse*)**

- A. Une pathologie cardiaque
- B. Une pneumonie
- C. Une origine vertébrale
- D. Un kyste de l'ovaire
- E. Une pathologie thyroïdienne

**7 - Le syndrome dysentérique réalise : (la réponse *juste*)**

- A. Une diarrhée glaireuse
- B. Sensation de faux besoins
- C. Un ténesme, des épreintes
- D. Une diarrhée sanglante
- E. Tous ces signes sont justes

**8 - La diarrhée motrice est : (la réponse *fausse*)**

- A. Liquidienne
- B. Post-prandiale précoce
- C. Hydroélectrolytique
- D. Peut se voir au cours de l'hypothyroïdie
- E. Elle est impérieuse avec des coliques abdominales

**9 - Parmi les causes de la constipation : (la réponse *fausse*)**

- A. Le diabète
- B. Une erreur diététique
- C. La grossesse
- D. Une insuffisance cardiaque
- E. Une hyperthyroïdie

**10 - Parmi les affirmations suivantes, concernant les occlusions par strangulation du grêle, lesquelles sont fausses : (les réponses *fausses*)**

- A. Elles entraînent des vomissements tardifs.
- B. L'abdomen peut être distendu.
- C. L'arrêt des matières et des gaz est tardifs.
- D. Elles présentent un risque évolutif vers la nécrose de l'anse.
- E. Le toucher rectal n'a aucune valeur pour le diagnostic

**11 - Quels signes cliniques sont en faveur d'une occlusion intestinale par sténose d'une tumeur maligne du rectum : (les réponses fausses)**

- A. Arrêt précoce des matières et des gaz.
- B. Vomissement précoces.
- C. Présence d'une cicatrice abdominale.
- D. Absence de distension abdominale.
- E. Distension abdominale intense.

**12 - Devant une occlusion intestinale aiguë : (la ou les réponses fausses)**

- A. Le météorisme abdominal est douloureux.
- B. L'hémorragie digestive à type d'hématémèse est l'étiologie la plus fréquente.
- C. L'examen des orifices herniaires n'est pas obligatoire.
- D. Le premier examen paraclinique à demander est un abdomen sans préparation.
- E. Le premier examen paraclinique à demander est un scanner abdominal.

**13. Parmi les pathologies suivantes, lesquelles provoquent une occlusion du grêle par obstruction ? (cochez les réponses justes)**

- A. Étranglement herniaire
- B. Iléus biliaire
- C. Tumeur iléale
- D. Volvulus intestinal sur bride
- E. Hypokaliémie

**14 - Parmi les éléments radiologiques suivant, ceux qui vous permettent de diagnostiquer une occlusion du grêle sont : (cochez les réponses justes)**

- A. Images hydro-aériques plus larges que hautes
- B. Images hydro-aériques plus hautes que larges
- C. Croissant gazeux sous diaphragmatique
- D. Images hydro-aériques centrales
- E. Aérobilie

**15 - Une rectorragie se définit : (la réponse fausse)**

- A. Par l'extériorisation du sang moulu avec des selles
- B. Par l'extériorisation du sang rouge vif en dehors des selles.
- C. S'accompagne souvent d'anémie.
- D. Peut être révélateur d'une tumeur maligne
- E. Est fréquente au cours des hémorroïdes

16. Le syndrome rectal associe une triade laquelle ? (les réponse justes)

- A. Ténésme
- B. Épreintes
- C. Faux besoins
- D. Constipation
- E. Mélaena

17. Lors d'une rectorragie l'examen physique essentiel est : (la réponse juste)

- A. L'inspection de l'abdomen.
- B. La palpation de l'abdomen.
- C. Le toucher vaginal.
- D. Le toucher rectal.
- E. L'examen des orifices herniaires

18. La fissure anale : (la réponse juste)

- A. Se manifeste par un écoulement purulent.
- B. Par une douleur périnéale et des prurits
- C. Due à une infection des glandes de la paroi rectale inférieure
- D. S'accompagne de rectorragies
- E. La cause principale est la diarrhée

19. La fistule péri-anale : (les réponses justes)

- A. Est due le plus souvent à une constipation chronique.
- B. Se caractérise par des abcès péri anaux à répétition se termine par des écoulements.
- C. Peut être révélatrice d'une maladie inflammatoire
- D. S'accompagne de diarrhées chroniques
- E. S'accompagne de mélaena

20 - Une anémie est définie en pratique chez un homme adulte de moins de 65 ans par : (réponse juste)

- A. Une TGMH (teneur globulaire moyenne en hémoglobine) inférieure à 27
- B. Un hématocrite inférieur à 47 %
- C. Un nombre de globules rouges inférieur à  $6 \times 10^9$
- D. Un taux d'hémoglobine inférieur à 13 g/dl
- E. Une diminution de la masse sanguine totale

**21 - Le premier mécanisme à évoquer en présence d'une anémie microcytaire arégénérative avec fer sérique bas et ferritinémie plasmatique basse est :**

- A. Une hémoglobinopathie
- B. Une carence en Vitamine B6
- C. Un déficit en Vitamine 612
- D. Une carence martiale
- E. Une inflammation

**22 - Devant une adénopathie chronique, quelles sont les examens complémentaires à demander ?**

(*les réponses justes*)

- A. FNS
- B. Cytoponction ganglionnaire
- C. Scanner thoracique
- D. Biopsie de l'adénopathie
- E. Myélogramme

**23 - Une adénopathie est dite inflammatoire si elle présente les signes cliniques suivants :**

(*les réponses justes*)

- A. Adhérence au plan profond
- B. Douleur
- C. Rougeur
- D. Mobilité
- E. Chaleur

**24 - Les signes cliniques suivants font partie du syndrome anémique sauf un lequel ?**

- A. Pâleur
- B. Asthénie
- C. Souffle diastolique organique
- D. Vertige
- E. Dyspnée d'effort

**25 - La hernie crurale : (cochez *la* réponse *juste*)**

- A. Se rencontre souvent chez le jeune enfant
- B. Est une hernie congénitale
- C. Peut-être oblique externe
- D. Très fréquente chez l'homme
- E. Est la forme anatomo-clinique qui se complique le plus d'étranglement.

**26 - La hernie inguinale oblique externe :** (cochez *une* réponse *fausse*)

- A. Possède un orifice situé en dehors des vaisseaux épigastriques
- B. A un orifice superficiel situé en dehors du grand droit de l'abdomen
- C. **S'extériorise au dessous de la ligne de Malgaigne**
- D. Peut contenir une corne vésicale
- E. Peut descendre dans la grande lèvre chez la femme.

**27 - Une hernie inguinale étranglée est :** (cochez *une* réponse *fausse*)

- A. Douleuruse
- B. Non impulsive à la toux
- C. **Réductible**
- D. Son collet est situé au-dessus de la ligne de Malgaigne
- E. Éventuellement accompagné de dysurie

**28 - L'hématémèse est :** (cochez *la* réponse *juste*)

- A. Un saignement fait de sang rouge.
- B. Un rejet de sang par la bouche au cours d'un effort de toux.
- C. Une émission de sang rouge vif par l'anus.
- D. **Un rejet par la bouche de sang au cours d'un effort de vomissement.**
- E. Une émission de selles séro-sanguinolentes.

**29 - L'estimation de la spoliation sanguine au cours d'une hémorragie digestive est faite sur :**  
(cochez *la* réponse *juste*)

- A. Uniquement sur l'état clinique.
- B. Seulement sur des critères biologiques.
- C. La quantité de sang rejetée.
- D. **Des critères cliniques, biologiques, et quantitatifs.**
- E. La présence d'un état de choc.

**30 - Le méléna se définit comme étant :** (cochez *la* réponse *juste*)

- A. Une émission de sang rouge par l'anus.
- B. Une émission de sang par la bouche au cours d'un effort de vomissement.
- C. **Une émission de selles noires, goudron par l'anus (correspondant à du sang digéré).**
- D. Une émission de sang au cours d'un effort de toux.
- E. Elle est toujours associée à une rectorragie.

**31 - Quelle est la proposition fausse :**

- A. L'hématémèse traduit toujours une lésion digestive haute
- B. L'Épistaxis déglutie est un symptôme à ne pas confondre avec l'hématémèse
- C. La rectorragie traduit toujours une lésion sus mésocolique
- D. Le méléna est un symptôme fréquent des lésions digestives hautes
- E. Les selles noires prêtent à confusion avec un méléna

**32 - Dans les vomissements aigus que faut-il rechercher ? (cochez la réponse fausse)**

- A. Une sténose du pylore
- B. Une pancréatite aiguë
- C. Une appendicite aiguë
- D. Une méningite
- E. Une grossesse

**33 - Dans la diarrhée aiguë, le syndrome dysentérique comprend : (la réponse juste)**

- A. Une diarrhée fécale, une douleur, des hémorroïdes
- B. Une diarrhée glaireuse, un syndrome rectal, une douleur
- C. Une diarrhée glaireuse, un syndrome rectal, des hémorroïdes
- D. Une diarrhée fécale, un syndrome rectal, une douleur
- E. Toutes les réponses sont fausses.

**34 - Dans la diarrhée aiguë les signes de gravité sont : (la ou les réponses justes)**

- A. Une fièvre
- B. Les signes de choc
- C. Une défense
- D. Une douleur au TR
- E. Une déshydratation

**35 - La dysphagie : (la ou les réponses justes)**

- A. Est une impossibilité totale de déglutir
- B. Peut être haute ou basse
- C. Est toujours aux solides
- D. Peut s'accompagner de dysphonie
- E. S'accompagne toujours de vomissements

**36 - La douleur ulcéreuse est : (la ou les réponses justes)**

- A. Le plus souvent de siège épigastrique
- B. Est post-prandiale tardive
- C. A type de crampe
- D. Aggravée par l'alimentation
- E. Calmée par les antiacides

**37 - Parmi les caractères d'une douleur abdominale, indiquez ceux qui font évoquer le diagnostic d'ulcère duodéal : (la ou les réponses justes)**

- A. Douleur épigastrique calmée par l'émission de gaz
- B. Douleur de l'hypochondre gauche irradiant à l'épaule gauche
- C. Douleur épigastrique post prandiale tardive
- D. Douleur de l'hypochondre droit calmée par la prise d'aspirine
- E. Douleur épigastrique calmée par la consommation d'aliments

**38 - Que peut signifier un signe de glaçon positif : (la ou les réponses justes)**

- A. Une splénomégalie
- B. Une masse abdominale
- C. Une circulation veineuse abdominale
- D. Une hépatomégalie
- E. Une hernie

**39 - Un signe de flot témoigne de : (la ou les réponses justes)**

- A. Existence d'une hypertension portale
- B. Existence d'une ascite
- C. D'une propagation d'une onde créée par pression sur la paroi abdominale
- D. L'examen se fait avec l'aide de deux personnes
- E. Retrouve une masse abdominale

**40 - Le diagnostic différentiel d'une ascite se fait avec : (la ou les réponses justes)**

- A. Un globe vésical
- B. Une tumeur ovarienne
- C. Un fibrome utérin
- D. Une grossesse
- E. Un kyste ovarien

**41 - Quels éléments évoquent un syndrome de malabsorption au cours d'une diarrhée chronique : (la ou les réponses justes)**

- A. Œdèmes des membres inférieurs
- B. Crise de tétanie
- C. Ictère
- D. Cheveux et ongles cassants
- E. Hématomes au moindre choc

**42 - La définition de la diarrhée chronique c'est : (la ou les réponses justes)**

- A. Une durée supérieure à 8 semaines
- B. Le poids des selles supérieur à 300 gr/j
- C. Une durée supérieure à 4 semaines
- D. Le poids des selles supérieur à 600 gr/j
- E. L'altération de l'état général

**43 - Dans le syndrome rectal l'épreinte est définie comme : (la réponse juste)**

- A. Tension douloureuse abdominale avec sensation de brûlure
- B. Une envie d'aller à la selle sans rien vider
- C. Une douleur abdominale colique basse et une contraction répétitive
- D. Une douleur abdominale colique haute et une contraction répétitive
- E. Toutes les réponses sont justes

**44 - On parle d'hépatomégalie lorsque la flèche hépatique mesurée sur la ligne médioclaviculaire est supérieure à :**

- A. 10 cm
- B. 14 cm
- C. 11 cm
- D. 09 cm
- E. 15 cm

**45 - Une hépatomégalie dure à surface irrégulière et nodulaire avec une circulation collatérale abdominale est le plus souvent due à : (Cochez les réponses fausses)**

- A. Un cancer primitif du foie
- B. Un cancer secondaire du foie
- C. Une cirrhose
- D. Une stéatose alcoolique
- E. Un kyste hydatique du foie

**46 - Devant une hépatomégalie, quel(s) signe(s) oriente(nt) vers un foie de cholestase?**

- A. Surface régulière, de consistance ferme
- B. Bord antérieur mousse
- C. Turgescence des jugulaires
- D. Bord antérieur tranchant
- E. Associé souvent à un ictère

**47 - Une splénomégalie stade IV est définie comme étant :**

- A. Une rate palpable en respiration normale sur la ligne mamelonnaire gauche, sans dépasser une ligne horizontale passant à égale distance entre le rebord costal et l'ombilic.
- B. Une Une rate palpable en inspiration profonde.
- C. Une rate palpable au niveau d'une ligne horizontale passant à égale distance entre l'ombilic et la symphyse pubienne sans la dépasser
- D. Une rate palpable en dessous d'une ligne horizontale passant à égale distance entre l'ombilic et la symphyse pubienne
- E. Toutes les réponses sont fausses

**48 - Devant une splénomégalie, tous les examens complémentaires suivant sont justifiés sauf un lequel ?**

- A. Hémogramme
- B. Biopsie ostéoméduillaire et ganglionnaire
- C. Myélogramme
- D. Scintigraphie osseuse
- E. Scanner abdominal

**49 - L'ictère est rétention ne si : (la ou les réponses justes)**

- A. Les urines sont claires et les selles sont normocolorées.
- B. Les urines sont foncées et les selles sont décolorées.
- C. Les transaminases sont élevées.
- D. Les téguments et conjonctives sont décolorés.
- E. Aucune réponse n'est juste.

**50 - L'ictère de type hémolytique : (la ou les réponses justes)**

- A. Est modéré, n'est jamais intense, pas de prurit
- B. S'accompagne d'urines foncées.
- C. Est suspecté devant une élévation de la bilirubine conjuguée.
- D. Les réponses a et b sont justes.
- E. Toutes les réponses sont justes.