

## Questions Sémiologie 3<sup>ème</sup> trimestre

---

### Appareil uro-génitale de l'enfant

**1 - Énurésie isolée chez l'enfant est définie comme :**

- A. miction nocturne involontaire après 5 ans.
- B. miction nocturne involontaire à 1 an.
- C. miction nocturne involontaire associée à des troubles mictionnels diurnes,
- D. incontinence urinaire diurne et nocturne
- E. incontinence diurne.

**2 - Hypospadias chez le garçon est défini comme :**

- A. abouchement du méat urétral à la face dorsale de la verge
- B. abouchement du méat urétral à la face ventrale de la verge
- C. abouchement du méat urétral au niveau de la fossette naviculaire
- D. hypospadias est souvent associé à une exstrophie de vessie
- E. hypospadias peut être associé à une ectopie testiculaire

**3 - Hernie inguinale non compliquée chez le nourrisson se manifeste par :**

- A. une tuméfaction inguinale réductible à la palpation.
- B. une tuméfaction inguinale impulsive à la toux et au pleurs.
- C. un arrêt des matières et des gaz chez le nourrisson.
- D. des pleurs incessants et refus de biberon.
- E. une fièvre avec altération de l'état général.

**4 - La cryptorchidie testiculaire du garçon se définit par :**

- A. la présence du testicule dans le scrotum.
- B. un testicule palpable au niveau inguinal.
- C. un testicule non palpable.
- D. un testicule palpable au niveau de la racine de la cuisse.
- E. un testicule palpable au niveau inguinal abaissable au scrotum.

### Appareil locomoteur

**5 - La douleur articulaire d'horaires inflammatoire est caractérisée par : (cochez la ou les réponse(s) juste(s))**

- A. Elle apparaît la première moitié de la nuit
- B. Elle est souvent accompagnée d'un dérouillage matinal
- C. Elle s'exacerbe lors de l'activité physique
- D. Elle est souvent responsable de troubles du sommeil
- E. Elle est souvent rencontrée dans les arthroses

**6 - L'arthrite septique est :**

- A. Une urgence thérapeutique
- B. Nécessite une antibiothérapie adaptée
- C. Peut être d'origine iatrogène
- D. Peut dégrader rapidement une articulation
- E. Survient uniquement chez les sujets immunodéprimés

**7 - Cochez les réponses justes parmi ces propositions :**

- A. La polyarthrite rhumatoïde est une enthésopathie
- B. L'arthrose est une dégradation du cartilage articulaire
- C. La spondylarthrite ankylosante survient principalement chez les sujets HLA B27
- D. Le syndrome de Fiessinger-Leroy-Reiter est une arthrite réactionnelle
- E. La polyarthrite rhumatoïde ne se voit jamais chez les enfants

**8 - Un rhumatisme est : (cochez la ou les réponse (s) juste (s))**

- A. Une paralysie
- B. Une artériopathie
- C. Une maladie articulaire
- D. Une maladie pour laquelle il n'existe aucune solution thérapeutique
- E. Un manque de vitamine D

**9 - Pour poser le diagnostic d'un genu varum du genou, l'examen clinique se fait ? (Cochez la ou les bonnes réponses)**

- A. En position debout statique
- B. En position debout dynamique
- C. Dans le plan frontal
- D. Dans le plan sagittal
- E. Mesure de l'écart inter condylien des genoux

**10 - L'examen clinique du choc rotulien se fait ? (Cochez la ou les bonnes réponses)**

- A. En décubitus dorsal
- B. En position debout
- C. En Percussion
- D. En Palpation
- E. En appuyant sur la rotule elle vient buter contre la trochlée, après avoir flotté sur le liquide

**11 - La luxation par définition est une ? (Cochez la ou les bonnes réponses)**

- A. Perte des rapports articulaires normaux
- B. Déchirure des ligaments
- C. Les ligaments sont intacts.
- D. Articulation déboîtée
- E. Pour certaines personnes le traumatisme peut être minime

**12 - Une fracture est dite ouverte lorsque ? (Cochez la ou les bonnes réponses)**

- A. En même temps il y a une fracture, avec une plaie.
- B. Une plaie fait communiquer le foyer de fracture directement avec l'extérieur
- C. L'ouverture est due au traumatisme
- D. L'ouverture est due au morceau d'os fracturé
- E. Le risque principal est l'infection

**13 - Concernant la hernie discale lombaire : (cochez la ou les réponses justes)**

- A. La sciatique L5 est due à une compression L4-L5
- B. La la sciatique S1 est due à une compression L5-S1
- C. Le trajet de la sciatique L5 : fesse, face postérieure de la cuisse et de la jambe, talon, bord externe du pied puis les petits orteils.
- D. Le trajet de la sciatique S1: fesse, face postérieure et ou externe de la cuisse, face externe du genou et de la jambe, dos du pied puis le gros orteil

**14 - Cochez la ou les réponses justes :**

- A. la douleur de la sciatique vertébrale commune est toujours spontanée
- B. dans la sciatique vertébrale commune la migration du nucleus pulposus se fait presque toujours vers l'arrière
- C. presque toutes les sciatiques vertébrales communes sont bilatérales
- D. dans la sciatique vertébrale commune par hernie discale les signes physiques ne dépendent pas de l'importance du conflit discoradiculaire

**15 - Cochez les réponses justes, dans la hernie discale lombaire :**

- A. Le signe de la sonnette confirme l'origine de la douleur
- B. Le signe de lasègue permet de tester la gravité du conflit discoradiculaire
- C. Le test de schober permet d'évaluer l'état de la souplesse rachidienne
- D. La topographie du trajet permet presque toujours de situer le siège du conflit discoradiculaire

**16 - Concernant l'ostéoporose : (cochez la ou les réponses justes)**

- A. c'est un processus naturelle qui entraîne une perte de la masse osseuse
- B. les os les plus susceptibles de se fracturer sont ceux de la hanche des vertèbres et du poignet
- C. les hommes sont les plus touchés
- D. il est possible de vivre sans aucune douleur quand on fait de l'ostéoporose

**17 - Parmi les causes de l'ostéoporose : (cochez la ou les réponses justes)**

- A. carence en oestrogènes
- B. excès en calcium
- C. utilisation de corticoïdes
- D. parfois aucune cause (idiopathique)

## Psychiatrie

### **18 - L'examen psychiatrique repose en premier temps sur :**

- A. L'observation de la mimique, des gestes et du comportement du patient
- B. L'examen somatique surtout neurologique.
- C. L'écoute du discours spontané.
- D. Les tests de la personnalité et les échelles d'évaluation.
- E. Des questions posées par le médecin afin de pouvoir poser un diagnostic.

### **19 - Le maniérisme vestimentaire exagérée peut faire penser à :**

- A. La schizophrénie.
- B. Un état dépressif.
- C. Un trouble obsessionnel compulsif.
- D. Personnalité paranoïaque.
- E. Une démence.

### **20 - La mimique du patient :**

- A. Traduit le langage verbal exprimé par la face.
- B. Est l'ensemble des expressions émotionnelles exagérées.
- C. Traduit les discordances entre les propos du patient et l'expression de son visage.
- D. Permet de lire ses émotions et ses sentiments
- E. Renvoie au traits de caractères au premier plan.

### **21 - Dans la schizophrénie des rires inadaptés et étranges traduisent :**

- A. Un rationalisme morbide.
- B. Une rationalisation des troubles.
- C. Un barrage.
- D. Une discordance.
- E. Un fading.

### **22 - Un contact familier, facile fait souvent penser à :**

- A. Un état dépressif
- B. Un accès maniaque.
- C. Une schizophrénie.
- D. Une psychose paranoïaque.
- E. Une confusion mentale.

### **23 - Dans l'état dépressif on redoute surtout :**

- A. L'insomnie du petit matin.
- B. L'hypersomnie de refuge.
- C. La somnolence excessive.
- D. L'insomnie d'endormissement.
- E. L'insomnie au milieu de la nuit.

## ORL

### **24 - L'otorrhée est :**

- A. l'écoulement de liquide muqueux de l'oreille.
- B. l'écoulement de liquide sanglant à travers le conduit.
- C. l'écoulement de liquide purulent de l'oreille.
- D. survient à la suite d'un traumatisme de l'oreille.
- E. l'écoulement de liquide céphalorachidien de l'oreille.

### **25 - L'épistaxis est due à ?**

- A. cancer des fosses nasales.
- B. angine aiguë.
- C. pic tensionnel.
- D. traumatisme facial.
- E. cancer du sinus ethmoïdal.

### **26 - L'odynophagie est :**

- A. une gêne à la déglutition.
- B. une douleur à la déglutition.
- C. une impossibilité à déglutir
- D. une douleur irradiant à l'oreille.
- E. une impossibilité à avaler les aliments solides.

### **27 - La dyspnée laryngée est caractérisé par :**

- A. cornage.
- B. bradypnée inspiratoire.
- C. bradypnée expiratoire.
- D. tirage sus sternal et intercostal.
- E. peut être due à un cancer du larynx.

## Neurologie / Neurochirurgie

### **28 - La force musculaire globale s'explore par :**

- A. La manoeuvre de mingazzini
- B. Le testing musculaire
- C. La manoeuvre de barré
- D. Le signe de romberg

### **29 - Le syndrome pyramidal se manifeste par :**

- A. une hypertonie spastique
- B. hypertonie plastique
- C. des réflexes ostéotendineux vifs, diffusés
- D. des réflexes ostéotendineux pendulaires.

**30 - L'aphasie de BROCA est caractérisé par :**

- A. une logorrhée
- B. une réduction du langage
- C. une lésion hémisphérique gauche chez le droitier
- D. une lésion hémisphérique droite chez le droitier

**31 - Le syndrome myasthénique est due à l'atteinte :**

- A. Du nerf périphérique
- B. Du muscle strié
- C. De la jonction neuromusculaire
- D. Du cortex cérébral

**32 - Le syndrome myogène se caractérise par :**

- A. Des fasciculations
- B. Une amyotrophie
- C. L'abolition de la contraction idio musculaire
- D. Des troubles sensitifs

**33 - L'H.L.H. droite on retrouve l'atteinte :**

- A. Des 2 hémichamps nasaux
- B. L'hémi champ temporal de l'oeil droit et l'hémi champ nasal de l'oeil gauche
- C. Des 2 hémi-champs temporaux
- D. L'hémi champ supérieur ou inférieur

**34 - L'atteinte de l'oculo-moteur externe se manifeste :**

- A. Ptosis
- B. Strabisme convergent
- C. Diplopie verticale
- D. Mydriase

**35 - Le syndrome méningé est présent dans :**

- A. L'hémorragie sous arachnoïdienne.
- B. Les méningites virales.
- C. Les tumeurs cérébrales.
- D. Les anévrismes intracrâniens non rompus.

**36 - Les céphalée des syndromes méningée sont :**

- A. De types hémicrâniés.
- B. Fronto-faciales.
- C. En casques.
- D. Occipitales.

**37- Dans le syndrome radiculaire, les signes sensitifs peuvent être de type :**

- A. Douleurs dans le territoire radiculaire.
- B. Sensation de picotements voire de brûlures.
- C. Hypoesthésie.
- D. Anesthésie.

**38 - Le tremblement du syndrome cérébelleux :**

- A. Survient au repos
- B. Est un tremblement d'attitude
- C. S'accompagne d'une hypotonie
- D. Peut être familial
- E. Peut être traitée chirurgicalement

**39 - Un ou plusieurs des éléments suivants n'est habituellement pas observé dans le syndrome cérébelleux :**

- A. Trouble de la marche
- B. Trouble de l'équilibre
- C. Dyschronométrie
- D. Tremblement de repos
- E. Danse des tendons

**40 - Au cours d'un syndrome vestibulaire périphérique, peut ou peuvent être observés :**

- A. De grands vertiges rotatoires avec vomissements
- B. Un nystagmus vertical
- C. Une déviation des index
- D. Signe de Romberg
- E. Dismétrie

**41 - Réponse fausse :**

La hanche est la plus grosse articulation de l'organisme

Sa douleur siège dans le pli de l'aîne, projection anatomique de l'articulation coxo-fémorale

La hanche peut aussi faire des mouvements de circumduction

Flexion : genou plié à 90°, la hanche peut être fléchie à 115°

**42 - Réponse fausse :**

- A. La hanche étant une articulation profonde, elle ne peut être palpée directement
- B. La gêne fonctionnelle de la hanche s'apprécie par l'indice algo-fonctionnel de hanche de Lequesne.
- C. Coxopathie chronique bilatérale était source de grabatarisme
- D. dduction : 20-30°

**43 - Réponse fausse :**

- A. Rotation interne :  $45^\circ$
- B. La hanche peut être fléchi à  $135^\circ$
- C. Adduction:  $30-40^\circ$
- D. Extension :  $50-70^\circ$ . C'est le mouvement le plus difficile à mesurer car son débattement est faible

**44 - L'hypertension intracrânienne chez le nourrisson se manifeste cliniquement par :**

- A. Un refus de tété
- B. Une macrocrânie
- C. Une enophtalmie
- D. Les yeux en position de couché de soleil.
- E. Une fontanelle bombante.

**45 - Une tumeur du plexus choroïde (papillome) peut être source d' hypertension intracrânienne par :**

- A. Une hypersécrétion du LCR.
- B. Une hydrocéphalie communicante.
- C. Un effet de masse de la tumeur.
- D. Un défaut de résorption du LCR.
- E. Un drainage veineux insuffisant.

**46 - L'hypertension intracrânienne isolée chez l'adulte se manifeste cliniquement par :**

- A. Des céphalées en casque
- B. Des vomissements en jet
- C. Une baisse de l'acuité visuelle
- D. Une exophtalmie.
- E. Un oedème papillaire au fond d'oeil

**47 - Le tonus musculaire est :**

- A. Un état de décontraction musculaire
- B. Un état de contraction permanent du muscle
- C. Un déséquilibre entre les voies activatrices et inhibitrices
- D. Apprécié par le ballant de la main

**Corrigé Type (Sémiologie - EMD 1 - 2016/2017)**

**47 QCM**

Questions / Réponses à cocher	A	B	C	D	E
Question 1	✓				
Question 2		✓			✓
Question 3	✓	✓			
Question 4		✓			
Question 5		✓		✓	
Question 6	✓	✓	✓	✓	
Question 7		✓	✓	✓	✓
Question 8			✓		
Question 9	✓		✓		✓
Question 10	✓		✓		✓
Question 11	✓	✓		✓	✓
Question 12	✓	✓	✓	✓	✓
Question 13	✓	✓			
Question 14		✓			
Question 15	✓	✓	✓	✓	
Question 16	✓	✓		✓	
Question 17	✓		✓	✓	
Question 18	✓		✓		
Question 19	✓				
Question 20				✓	

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
Question 21				✓	
Question 22		✓			
Question 23	✓				
Question 24	✓		✓		
Question 25	✓		✓	✓	✓
Question 26		✓			
Question 27	✓	✓		✓	✓
Question 28	✓		✓		
Question 29	✓		✓		
Question 30		✓	✓		
Question 31			✓		
Question 32		✓	✓		
Question 33		✓			
Question 34		✓			
Question 35	✓	✓			
Question 36			✓		
Question 37	✓	✓	✓	✓	
Question 38		✓	✓		
Question 39				✓	
Question 40	✓	✓	✓	✓	
Question 41				✓	
Question 42				✓	
Question 43				✓	
Question 44	✓	✓		✓	✓
Question 45	✓	✓	✓		
Question 46	✓	✓	✓		✓
Question 47		✓		✓	